

# 2010年江西高考理科数学真题及答案

## 第I卷

一、选择题：本大题共12小题，每小题5分，共60分。在每个小题给出的四个选项中，有一项是符合题目要求的。

1. 已知  $(x+i)(1-i)=y$ ，则实数  $x, y$  分别为 ( )

- A.  $x=-1, y=1$                   B.  $x=-1, y=2$   
 C.  $x=1, y=1$                   D.  $x=1, y=2$

2. 若集合  $A=\{x||x|\leq 1, x\in R\}$ ， $B=\{y|y=x^2, x\in R\}$ ，则  $A\cap B=( )$

- A.  $\{x|-1\leq x\leq 1\}$               B.  $\{x|x\geq 0\}$   
 C.  $\{x|0\leq x\leq 1\}$               D.  $\emptyset$

3. 不等式  $\left|\frac{x-2}{x}\right| > \frac{x-2}{x}$  的解集是 ( )

- A.  $(0,2)$       B.  $(-\infty,0)$       C.  $(2,+\infty)$       D.  $(-\infty, 0)\cup(0,+\infty)$

4.  $\lim_{x\rightarrow\infty}\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\dots+\frac{1}{3^n}\right) = ( )$

- A.  $\frac{5}{3}$       B.  $\frac{3}{2}$       C. 2      D. 不存在

5. 等比数列  $\{a_n\}$  中， $a_1=2, a_8=4$ ，函数  $f(x)=x(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_8)$ ，则  $f'(0) = ( )$


- A.  $2^6$       B.  $2^9$       C.  $2^{12}$       D.  $2^{15}$

6.  $(2-\sqrt{x})^8$  展开式中不含  $x^4$  项的系数的和为 ( )

- A. -1      B. 0      C. 1      D. 2

7. E, F 是等腰直角  $\triangle ABC$  斜边 AB 上的三等分点，则  $\tan \angle ECF = ( )$

- A.  $\frac{16}{27}$       B.  $\frac{2}{3}$       C.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$       D.  $\frac{3}{4}$



8. 直线  $y=kx+3$  与圆  $(x-3)^2+(y-2)^2=4$  相交于 M, N 两点，若  $|MN|\geq 2\sqrt{3}$ ，则 k 的取值范围是

- A.  $\left[-\frac{3}{4}, 0\right]$       B.  $\left[-\infty, -\frac{3}{4}\right] \cup [0, +\infty]$       C.  $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$       D.  $\left[-\frac{2}{3}, 0\right]$

9. 给出下列三个命题:

①函数  $y = \frac{1}{2} \ln \frac{1-\cos x}{1+\cos x}$  与  $y = \ln \tan \frac{x}{2}$  是同一函数;

②若函数  $y = f(x)$  与  $y = g(x)$  的图像关于直线  $y = x$  对称, 则函数  $y = f(2x)$  与  $y = \frac{1}{2}g(x)$  的图像也关于直线  $y = x$  对称;


③若奇函数  $f(x)$  对定义域内任意  $x$  都有  $f(x) = f(2-x)$ , 则  $f(x)$  为周期函数。

其中真命题是

- A. ①②      B. ①③      C. ②③      D. ②

10. 过正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的顶点 A 作直线 L, 使 L 与棱  $AB, AD, AA_1$  所成的角都相等, 这样的直线 L 可以作


- A. 1 条      B. 2 条      C. 3 条      D. 4 条



11. 一位国王的铸币大臣在每箱 100 枚的硬币中各掺入了一枚劣币, 国王怀疑大臣作弊, 他用两种方法来检测。方法一: 在 10 箱子中各任意抽查一枚; 方法二: 在 5 箱中各任意抽查两枚。国王用方法一、二能发现至少一枚劣币的概率分别为  $p_1$  和  $p_2$ , 则

- A.  $p_1 = p_2$       B.  $p_1 < p_2$       C.  $p_1 > p_2$       D. 以上三种情况都有可能


12. 如图, 一个正五角星薄片 (其对称轴与水面垂直) 匀速地升出水面, 记  $t$  时刻五角星露出水面部分的图形面积为  $S(t)$  ( $S(0) = 0$ ), 则导函数  $y = S'(t)$  的图像大致为



二、填空题: 本大题共 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分。请把答案填在答题卡上。


13. 已知向量  $\vec{a}, \vec{b}$  满足  $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 2, \vec{a}$  与  $\vec{b}$  的夹角为  $60^\circ$ , 则  $|\vec{a} - \vec{b}| = \underline{\hspace{2cm}}$

14. 将 6 位志愿者分成 4 组, 其中两个各 2 人, 另两个组各 1 人, 分赴世博会的四个不同场馆服务, 不同的分配方案有          种 (用数字作答)。



15. 点  $A(x_0, y_0)$  在双曲线  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{32} = 1$  的右支上, 若点 A 到右焦点的距离等于  $2x_0$ , 则  $x_0 =$

16. 如图, 在三棱锥  $O-ABC$  中, 三条棱  $OA, OB, OC$  两两垂直, 且  $OA > OB > OC$ , 分别经过三条棱  $OA, OB, OC$  作一个截面平分三棱锥的体积, 截面面积依次为  $S_1, S_2, S_3$ , 则  $S_1, S_2, S_3$  的大小关系为\_\_\_\_\_。



三、解答题: 本大题共 6 小题, 共 74 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本小题满分 12 分)

已知函数  $f(x) = (1 + \cot x) \sin^2 x + m \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ 。

(1) 当  $m=0$  时, 求  $f(x)$  在区间  $\left[\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{4}\right]$  上的取值范围;

(2) 当  $\tan a = 2$  时,  $f(a) = \frac{3}{5}$ , 求  $m$  的值。

18. (本小题满分 12 分)

某迷宫有三个通道, 进入迷宫的每个人都要经过一扇智能门。首次到达此门, 系统会随机 (即等可能) 为你打开一个通道, 若是 1 号通道, 则需要 1 小时走出迷宫; 若是 2 号、3 号通道, 则分别需要 2 小时、3 小时返回智能门。再次到达智能门时, 系统会随机打开一个你未到过的通道, 直至走完迷宫为止。令  $\xi$  表示走出迷宫所需的时间。

(1) 求  $\xi$  的分布列;

(2) 求  $\xi$  的数学期望。

19. (本小题满分 12 分)

设函数  $f(x) = \ln x + \ln(2-x) + ax (a > 0)$ 。

(1) 当  $a=1$  时, 求  $f(x)$  的单调区间。


(2) 若  $f(x)$  在  $(0,1]$  上的最大值为  $\frac{1}{2}$ , 求  $a$  的值。

20. (本小题满分 12 分)

如图  $\triangle BCD$  与  $\triangle MCD$  都是边长为 2 的正三角形, 平面  $MCD \perp$  平面  $BCD$ ,  $AB \perp$  平面  $BCD$ ,  $AB = 2\sqrt{3}$ 。

(1) 求点  $A$  到平面  $MBC$  的距离;

(2) 求平面  $ACM$  与平面  $BCD$  所成二面角的正弦值。



21. (本小题满分 12 分)

设椭圆  $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ , 抛物线  $C_2: x^2 + by = b^2$ 。

(1) 若  $C_2$  经过  $C_1$  的两个焦点, 求  $C_1$  的离心率;

(2) 设  $A(0, b)$ ,  $Q\left(3\sqrt{3}, \frac{5}{4}\right)$ , 又  $M, N$  为  $C_1$  与  $C_2$  不在  $y$  轴上的两个交点, 若  $\triangle AMN$  的

垂心为  $B\left(0, \frac{3}{4}b\right)$ , 且  $\triangle QMN$  的重心在  $C_2$  上, 求椭圆  $C_1$  和抛物线  $C_2$  的方程。

22. (本小题满分 14 分)

证明以下命题:

- (1) 对任一正整  $a$ , 都存在整数  $b, c (b < c)$ , 使得  $a^2, b^2, c^2$  成等差数列。
- (2) 存在无穷多个互不相似的三角形  $\triangle_n$ , 其边长  $a_n, b_n, c_n$  为正整数且  $a_n^2, b_n^2, c_n^2$  成等差数列。

# 2010年江西高考理科数学真题及答案

## 第I卷

一、选择题：本大题共12小题，每小题5分，共60分。在每个小题给出的四个选项中，有一项是符合题目要求的。

1. 已知  $(x+i)(1-i)=y$ ，则实数  $x, y$  分别为 ( )

- A.  $x=-1, y=1$                   B.  $x=-1, y=2$   
C.  $x=1, y=1$                   D.  $x=1, y=2$

【答案】 D

【解析】 考查复数的乘法运算。可采用展开计算的方法，得  $(x-i^2)+(1-x)i=y$ ，没有虚部， $x=1, y=2$ 。

2. 若集合  $A=\{x||x|\leq 1, x\in R\}$ ， $B=\{y|y=x^2, x\in R\}$ ，则  $A\cap B=( )$

- A.  $\{x|-1\leq x\leq 1\}$               B.  $\{x|x\geq 0\}$   
C.  $\{x|0\leq x\leq 1\}$               D.  $\emptyset$

【答案】 C

【解析】 考查集合的性质与交集以及绝对值不等式运算。常见的解法为计算出集合  $A, B$ ：  
 $A=\{x|-1\leq x\leq 1\}$ ， $B=\{y|y\geq 0\}$ ，解得  $A\cap B=\{x|0\leq x\leq 1\}$ 。在应试中可采用特值检验完成。

3. 不等式  $\left|\frac{x-2}{x}\right|>\frac{x-2}{x}$  的解集是 ( )

- A.  $(0,2)$     B.  $(-\infty,0)$     C.  $(2,+\infty)$     D.  $(-\infty, 0)\cup(0,+\infty)$

【答案】 A

【解析】 考查绝对值不等式的化简。绝对值大于本身，值为负数。 $\frac{x-2}{x}<0$ ，解得 A。  
或者选择  $x=1$  和  $x=-1$ ，两个检验进行排除。

4.  $\lim_{x\rightarrow\infty}\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{3^n}\right)=( )$

- A.  $\frac{5}{3}$     B.  $\frac{3}{2}$     C. 2    D. 不存在

【答案】 B

【解析】考查等比数列求和与极限知识. 解法一: 先求和, 然后对和取极限。

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1 - \frac{1}{3^n}}{1 - \frac{1}{3}} \right) = \frac{3}{2}$$

5. 等比数列  $\{a_n\}$  中,  $a_1 = 2$ ,  $a_8 = 4$ , 函数  $f(x) = x(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_8)$ , 则  $f'(0) =$  ( )

- A.  $2^6$       B.  $2^9$       C.  $2^{12}$       D.  $2^{15}$

【答案】C

【解析】考查多项式函数的导数公式, 重点考查学生创新意识, 综合与灵活地应用所学的数学知识、思想和方法。考虑到求导中, 含有  $x$  项均取 0, 则  $f'(0)$  只与函数  $f(x)$  的一次项有关; 得:  $a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdots a_8 = (a_1 a_8)^4 = 2^{12}$ 。

6.  $(2 - \sqrt{x})^8$  展开式中不含  $x^4$  项的系数的和为 ( )

- A. -1      B. 0      C. 1      D. 2

【答案】B

【解析】考查对二项式定理和二项展开式的性质, 重点考查实践意识和创新能力, 体现正难则反。采用赋值法, 令  $x=1$  得: 系数和为 1, 减去  $x^4$  项系数  $C_8^8 2^0 (-1)^8 = 1$  即为所求, 答案为 0。

7. E, F 是等腰直角  $\triangle ABC$  斜边 AB 上的三等分点, 则  $\tan \angle ECF =$  ( )

- A.  $\frac{16}{27}$       B.  $\frac{2}{3}$       C.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$       D.  $\frac{3}{4}$

【答案】D

【解析】考查三角函数的计算、解析化应用意识。

解法 1: 约定  $AB=6$ ,  $AC=BC=3\sqrt{2}$ , 由余弦定理  $CE=CF=\sqrt{10}$ , 再由余弦


定理得  $\cos \angle ECF = \frac{4}{5}$ ,

解得  $\tan \angle ECF = \frac{3}{4}$

解法 2: 坐标化。约定  $AB=6$ ,  $AC=BC=3\sqrt{2}$ ,  $F(1, 0)$ ,  $E(-1, 0)$ ,  $C(0, 3)$

利用向量的夹角公式得

$\cos \angle ECF = \frac{4}{5}$ , 解得  $\tan \angle ECF = \frac{3}{4}$ 。



8. 直线  $y = kx + 3$  与圆  $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 4$  相交于 M, N 两点, 若  $|MN| \geq 2\sqrt{3}$ , 则 k 的取值范围是

- A.  $[-\frac{3}{4}, 0]$       B.  $[-\infty, -\frac{3}{4}] \cup [0, +\infty]$       C.  $[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}]$       D.  $[-\frac{2}{3}, 0]$


【答案】A

【解析】考查直线与圆的位置关系、点到直线距离公式, 重点考察数形结合的运用.

解法 1: 圆心的坐标为 (3, 2), 且圆与 y 轴相切. 当

$|MN| = 2\sqrt{3}$  时, 由点到直线距离公式, 解得  $[-\frac{3}{4}, 0]$ ;

解法 2: 数形结合, 如图由垂径定理得夹在两直线之间即可, 不取  $+\infty$ , 排除 B, 考虑区间不对称, 排除 C, 利用斜率估值, 选 A



9. 给出下列三个命题:

① 函数  $y = \frac{1}{2} \ln \frac{1-\cos x}{1+\cos x}$  与  $y = \ln \tan \frac{x}{2}$  是同一函数;

② 若函数  $y = f(x)$  与  $y = g(x)$  的图像关于直线  $y = x$  对称, 则函数

$y = f(2x)$  与  $y = \frac{1}{2} g(x)$  的图像也关于直线  $y = x$  对称;

③ 若奇函数  $f(x)$  对定义域内任意 x 都有  $f(x) = f(2-x)$ , 则  $f(x)$  为周期函数.

其中真命题是

- A. ①②      B. ①③      C. ②③      D. ②

【答案】C


【解析】考查相同函数、函数对称性的判断、周期性知识. 考虑定义域不同, ①错误; 排除 A、B, 验证③,  $f(-x) = f[2-(-x)] = f(2+x)$ , 又通过奇函数得  $f(-x) = -f(x)$ , 所以  $f(x)$  是周期为 2 的周期函数, 选择 C.

10. 过正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  的顶点 A 作直线 L, 使 L 与棱  $AB, AD, AA_1$  所成的角都相等, 这样的直线 L 可以作

- A. 1 条      B. 2 条      C. 3 条      D. 4 条

【答案】D

【解析】考查空间感和线线夹角的计算和判断, 重点考查学生分类、划归转化的能力. 第一类: 通过点 A 位于三条棱之间的直线有一条体对角线  $AC_1$ . 第二类: 在图形外部和每条棱的外角和另 2 条棱夹角相等, 有 3 条, 合计 4 条.



11. 一位国王的铸币大臣在每箱 100 枚的硬币中各掺入了一枚劣币，国王怀疑大臣作弊，他用两种方法来检测。方法一：在 10 箱子中各任意抽查一枚；方法二：在 5 箱中各任意抽查两枚。国王用方法一、二能发现至少一枚劣币的概率分别为  $p_1$  和  $p_2$ ，则

- A.  $p_1 = p_2$       B.  $p_1 < p_2$       C.  $p_1 > p_2$       D. 以上三种情况都有可能

【答案】B


【解析】考查不放回的抽球、重点考查二项分布的概率。本题是北师大版新课标的课堂作业，作为旧大纲的最后一年高考，本题给出一个强烈的导向信号。方法一：每箱的选中的概率为

$$\frac{1}{10}$$

，总概率为  $1 - C_{10}^0 (0.1)^0 (0.9)^{10}$ ；同理，方法二：每箱的选中的概率为  $\frac{1}{5}$ ，总事件的概率为

$$1 - C_5^0 \left(\frac{1}{5}\right)^0 \left(\frac{4}{5}\right)^5$$
，作差得  $p_1 < p_2$ 。

12. 如图，一个正五角星薄片（其对称轴与水面垂直）匀速地升出水面，记  $t$  时刻五角星露出水面部分的图形面积为  $S(t)$  ( $S(0) = 0$ )，则导函数  $y = S'(t)$  的图像大致为



【答案】A

【解析】本题考查函数图像、导数图、导数的实际意义等知识，重点考查的是对数学的探究能力和应用能力。最初零时刻和最后终点时刻没有变化，导数取零，排除 C；总面积一直保持增加，没有负的改变量，排除 B；考察 A、D 的差异在于两肩位置的改变是否平滑，考虑到导数的意义，判断此时面积改变为突变，产生中断，选择 A。


二、填空题：本大题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。请把答案填在答题卡上。

13. 已知向量  $\vec{a}$ ， $\vec{b}$  满足  $|\vec{a}| = 1$ ， $|\vec{b}| = 2$ ， $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  的夹角为  $60^\circ$ ，则  $|\vec{a} - \vec{b}| = \underline{\quad}$

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】考查向量的夹角和向量的模长公式，以及向量三角形法则、余弦定理等知识，如图  $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ ， $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ ， $\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}$ ，由余弦定理得：

$$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{3}$$



14. 将 6 位志愿者分成 4 组，其中两个各 2 人，另两个组各 1 人，分赴世博会的四个不同场

馆服务，不同的分配方案有\_\_\_\_\_种（用数字作答）。

【答案】 1080

【解析】考查概率、平均分组合分配问题等知识，重点考查化归转化和应用知识的意识。先分组，考虑到有2个是平均分组合，得两个两人组 $\frac{C_6^2 C_4^2}{A_2^2}$ 两个一人组 $\frac{C_2^1 C_1^1}{A_2^2}$ ，再全排列得：

$$\frac{C_6^2 C_4^2}{A_2^2} \cdot \frac{C_2^1 C_1^1}{A_2^2} \cdot A_4^4 = 1080$$


15. 点  $A(x_0, y_0)$  在双曲线  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{32} = 1$  的右支上，若点 A 到右焦点的距离等于  $2x_0$ ，则  $x_0 =$

【答案】 2

【解析】考查圆锥曲线的基本概念和第二定义的转化，读取  $a=2, c=6, \frac{r}{d} = e \Rightarrow r = 3d$ ，

$$2x_0 = 3(x_0 - \frac{a^2}{c}) \Rightarrow x_0 = 2$$

16. 如图，在三棱锥  $O-ABC$  中，三条棱  $OA, OB, OC$  两两垂直，且  $OA > OB > OC$ ，分别经过三条棱  $OA, OB, OC$  作一个截面平分三棱锥的体积，截面面积依次为  $S_1, S_2, S_3$ ，则  $S_1, S_2, S_3$  的大小关系为\_\_\_\_\_。



【答案】  $S_3 < S_2 < S_1$

【解析】考查立体图形的空间感和数学知识的运用能力，通过补形，借助长方体验证结论，特殊化，令边长为 1, 2, 3 得  $S_3 < S_2 < S_1$ 。

三、解答题：本大题共 6 小题，共 74 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. （本小题满分 12 分）

已知函数 
$$f(x) = (1 + \cot x) \sin^2 x + m \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)。$$

(1) 当  $m=0$  时, 求  $f(x)$  在区间  $[\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{4}]$  上的取值范围;

(2) 当  $\tan a = 2$  时,  $f(a) = \frac{3}{5}$ , 求  $m$  的值。

**【解析】** 考查三角函数的化简、三角函数的图像和性质、已知三角函数值求值问题。依托三角函数化简, 考查函数值域, 作为基本的知识交汇问题, 考查基本三角函数变换, 属于中等题。

解 : ( 1 ) 当  $m=0$  时 ,

$$f(x) = (1 + \frac{\cos x}{\sin x}) \sin^2 x = \sin^2 x + \sin x \cos x = \frac{1 - \cos 2x + \sin 2x}{2}$$

$$= \frac{1}{2} [\sqrt{2} \sin(2x - \frac{\pi}{4}) + 1], \text{ 由已知 } x \in [\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{4}], \text{ 得 } 2x - \frac{\pi}{4} \in [-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]$$

从而得:  $f(x)$  的值域为  $[0, \frac{1+\sqrt{2}}{2}]$

$$(2) f(x) = (1 + \frac{\cos x}{\sin x}) \sin^2 x + m \sin(x + \frac{\pi}{4}) \sin(x - \frac{\pi}{4})$$

$$\text{化简得: } f(x) = \frac{1}{2} [\sin 2x + (1+m) \cos 2x] + \frac{1}{2}$$

$$\text{当 } \tan a = 2, \text{ 得: } \sin 2a = \frac{2 \sin a \cos a}{\sin^2 a + \cos^2 a} = \frac{2 \tan a}{1 + \tan^2 a} = \frac{4}{5}, \cos 2a = \frac{3}{5},$$

代入上式,  $m=-2$ .

18. (本小题满分 12 分)

某迷宫有三个通道, 进入迷宫的每个人都要经过一扇智能门。首次到达此门, 系统会随机 (即等可能) 为你打开一个通道, 若是 1 号通道, 则需要 1 小时走出迷宫; 若是 2 号、3 号通道, 则分别需要 2 小时、3 小时返回智能门。再次到达智能门时, 系统会随机打开一个你未到过的通道, 直至走完迷宫为止。令  $\xi$  表示走出迷宫所需的时间。

(3) 求  $\xi$  的分布列;

(4) 求  $\xi$  的数学期望。

**【解析】** 考查数学知识的实际背景, 重点考查相互独立事件的概率乘法公式计算事件的概率、随机事件的数学特征和对思维能力、运算能力、实践能力的考查。

(1) 必须要走到 1 号门才能走出,  $\xi$  可能的取值为 1, 3, 4, 6

$$P(\xi = 1) = \frac{1}{3},$$

$$P(\xi = 3) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6},$$

$$P(\xi = 4) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6},$$

$$P(\xi = 6) = A_2^2 \left( \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \right) \times 1 = \frac{1}{3}$$

分布列为：

$\xi$	1	3	4	6
$P$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$

$$(2) E\xi = 1 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{3} = \frac{7}{2} \text{ 小时}$$

19. (本小题满分 12 分)

设函数  $f(x) = \ln x + \ln(2-x) + ax (a > 0)$ 。

(1) 当  $a=1$  时，求  $f(x)$  的单调区间。

(2) 若  $f(x)$  在  $(0,1]$  上的最大值为  $\frac{1}{2}$ ，求  $a$  的值。

【解析】考查函数导数运算、利用导数处理函数最值等知识。

解：对函数求导得： $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2-x} + a$ ，定义域为  $(0, 2)$

(1) 单调性的处理，通过导数的零点进行穿线判别符号完成。

$$\text{当 } a=1 \text{ 时，令 } f'(x) = 0 \text{ 得 } \frac{1}{x} - \frac{1}{2-x} + 1 = 0 \Rightarrow \frac{-x^2 + 2}{x(2-x)} = 0$$

当  $x \in (0, \sqrt{2})$ ,  $f'(x) > 0$ , 为增区间；当  $x \in (\sqrt{2}, 2)$ ,  $f'(x) < 0$ , 为减函数。

(2) 区间  $(0,1]$  上的最值问题，通过导数得到单调性，结合极值点和端点的比较得到，确定

待定量  $a$  的值。

当  $x \in (0,1]$  有最大值，则必不为减函数，且  $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2-x} + a > 0$ ，为单调递增区间。


最大值在右端点取到。  $f_{\max} = f(1) = a = \frac{1}{2}$ 。

20. (本小题满分 12 分)

如图  $\triangle BCD$  与  $\triangle MCD$  都是边长为 2 的正三角形，平面  $MCD \perp$  平面  $BCD$ ， $AB \perp$  平面  $BCD$ ， $AB = 2\sqrt{3}$ 。

(3) 求点  $A$  到平面  $MBC$  的距离；

(4) 求平面  $ACM$  与平面  $BCD$  所成二面角的正弦值。



【解析】本题以图形拼折为载体主要考查了考查立体图形的空间感、点到直线的距离、二面角、空间向量、二面角平面角的判断有关知识，同时也考查了空间想象能力和推理能力

解法一：(1) 取  $CD$  中点  $O$ ，连  $OB$ ， $OM$ ，则  $OB \perp CD$ ， $OM \perp CD$ 。又平面  $MCD \perp$  平面  $BCD$ ，则  $MO \perp$  平面  $BCD$ ，所以  $MO \parallel AB$ ， $A$ 、 $B$ 、 $O$ 、 $M$  共面。延长  $AM$ 、 $BO$  相交于  $E$ ，则  $\angle AEB$  就是  $AM$  与平面  $BCD$  所成的角。 $OB=MO=\sqrt{3}$ ， $MO \parallel AB$ ， $MO \parallel$  面  $ABC$ ， $M$ 、 $O$  到平面  $ABC$  的距离相等，作  $OH \perp BC$  于  $H$ ，连  $MH$ ，则  $MH \perp BC$ ，求得：

$$OH=OC\sin 60^{\circ}=\frac{\sqrt{3}}{2}, MH=\frac{\sqrt{15}}{2}, \text{ 利用 体 积 相 等 得 :}$$

$$V_{A-MBC} = V_{M-ABC} \Rightarrow d = \frac{2\sqrt{15}}{5}.$$

(2)  $CE$  是平面  $ACM$  与平面  $BCD$  的交线。

由 (1) 知， $O$  是  $BE$  的中点，则  $BCED$  是菱形。

作  $BF \perp EC$  于  $F$ ，连  $AF$ ，则  $AF \perp EC$ ， $\angle AFB$  就是二面角  $A-EC-B$  的平面角，设为  $\theta$ 。

因为  $\angle BCE=120^{\circ}$ ，所以  $\angle BCF=60^{\circ}$ 。

$$BF = BC \cdot \sin 60^{\circ} = \sqrt{3},$$

$$\tan \theta = \frac{AB}{BF} = 2, \sin \theta = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

所以，所求二面角的正弦值是  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。



【点评】传统方法在处理时要注意到辅助线的处理，一般采用射影、垂线、平行线等特殊位置的元素解决

解法二：取  $CD$  中点  $O$ ，连  $OB$ ， $OM$ ，则  $OB \perp CD$ ， $OM \perp CD$ ，又平面  $MCD \perp$  平面  $BCD$ ，则  $MO \perp$  平面  $BCD$ 。

以  $O$  为原点，直线  $OC$ 、 $BO$ 、 $OM$  为  $x$  轴， $y$  轴， $z$  轴，建立空间直角坐标系如图。

$OB=OM=\sqrt{3}$ ，则各点坐标分别为  $O(0, 0, 0)$ ， $C(1, 0, 0)$ ， $M(0, 0, \sqrt{3})$ ， $B(0, -\sqrt{3}, 0)$ ， $A(0, -\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$ ，

(1) 设  $\vec{n}=(x, y, z)$  是平面  $MBC$  的法向量，则  $\vec{BC}=(1, \sqrt{3}, 0)$ ， $\vec{BM}=(0, \sqrt{3}, \sqrt{3})$ ，由  $\vec{n} \perp \vec{BC}$  得  $x+\sqrt{3}y=0$ ；由  $\vec{n} \perp \vec{BM}$  得  $\sqrt{3}y+\sqrt{3}z=0$ ；取  $\vec{n}=(\sqrt{3}, -1, 1)$ ， $\vec{BA}=(0, 0, 2\sqrt{3})$ ，则距离



$$d = \frac{|\overrightarrow{BA} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{2\sqrt{15}}{5}$$

$$(2) \overrightarrow{CM} = (-1, 0, \sqrt{3}), \overrightarrow{CA} = (-1, -\sqrt{3}, 2\sqrt{3}).$$

设平面  $ACM$  的法向量为  $\vec{n}_1 = (x, y, z)$ , 由  $\begin{cases} \vec{n}_1 \perp \overrightarrow{CM} \\ \vec{n}_1 \perp \overrightarrow{CA} \end{cases}$  得  $\begin{cases} -x + \sqrt{3}z = 0 \\ -x - \sqrt{3}y + 2\sqrt{3}z = 0 \end{cases}$ . 解得

$x = \sqrt{3}z, y = z$ , 取  $\vec{n}_1 = (\sqrt{3}, 1, 1)$ . 又平面  $BCD$  的法向量为  $\vec{n} = (0, 0, 1)$ , 则

$$\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

设所求二面角为  $\theta$ , 则  $\sin \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ .

**【点评】** 向量方法作为沟通代数和几何的工具在考察中越来越常见, 此类方法的要点在于建立恰当的坐标系, 便于计算, 位置关系明确, 以计算代替分析, 起到简化的作用, 但计算必须慎之又慎

21. (本小题满分 12 分)

设椭圆  $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ , 抛物线  $C_2: x^2 + by = b^2$ .

(3) 若  $C_2$  经过  $C_1$  的两个焦点, 求  $C_1$  的离心率;

(4) 设  $A(0, b)$ ,  $Q\left(3\sqrt{3}, \frac{5}{4}\right)$ , 又  $M, N$  为  $C_1$  与  $C_2$  不在  $y$  轴上的两个交点, 若  $\triangle AMN$  的

垂心为  $B\left(0, \frac{3}{4}b\right)$ , 且  $\triangle QMN$  的重心在  $C_2$  上, 求椭圆  $C_1$  和抛物线  $C_2$  的方程。

**【解析】** 考查椭圆和抛物线的定义、基本量, 通过交点三角形来确认方程。


(1) 由已知椭圆焦点  $(c, 0)$  在抛物线上, 可得:  $c^2 = b^2$ , 由

$$a^2 = b^2 + c^2 = 2c^2, \text{ 有 } \frac{c^2}{a^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow e = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

(2) 由题设可知  $M, N$  关于  $y$  轴对称, 设  $M(-x_1, y_1), N(x_1, y_1) (x_1 > 0)$ , 由  $\triangle AMN$  的垂心为  $B$ , 有

$$\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AN} = 0 \Rightarrow -x_1^2 + (y_1 - \frac{3}{4}b)(y_1 - b) = 0.$$

由点  $N(x_1, y_1)$  在抛物线上,  $x_1^2 + by_1 = b^2$ , 解得:  $y_1 = -\frac{b}{4}$  或  $y_1 = b$  (舍去)



故  $x_1 = \frac{\sqrt{5}}{2}b, M(-\frac{\sqrt{5}}{2}b, -\frac{b}{4}), N(\frac{\sqrt{5}}{2}b, -\frac{b}{4})$ , 得  $\triangle QMN$  重心坐标  $(\sqrt{3}, \frac{b}{4})$ .

由重心在抛物线上得:  $3 + \frac{b^2}{4} = b^2$ , 所以  $b=2$ ,  $M(-\sqrt{5}, -\frac{1}{2}), N(\sqrt{5}, -\frac{1}{2})$ , 又因为

M、N 在椭圆上得:  $a^2 = \frac{16}{3}$ , 椭圆方程为  $\frac{x^2}{\frac{16}{3}} + \frac{y^2}{4} = 1$ , 抛物线方程为  $x^2 + 2y = 4$ .

22. (本小题满分 14 分)

证明以下命题:

- (3) 对任一正整  $a$ , 都存在整数  $b, c (b < c)$ , 使得  $a^2, b^2, c^2$  成等差数列。  
 (4) 存在无穷多个互不相似的三角形  $\triangle_n$ , 其边长  $a_n, b_n, c_n$  为正整数且  $a_n^2, b_n^2, c_n^2$  成等差数列。

【解析】作为压轴题, 考查数学综合分析问题的能力以及创新能力。

(1) 考虑到结构要证  $a^2 + c^2 = 2b^2$ , ; 类似勾股数进行拼凑。

证明: 考虑到结构特征, 取特值  $1^2, 5^2, 7^2$  满足等差数列, 只需取  $b=5a, c=7a$ , 对一切正整数  $a$  均能成立。

结合第一问的特征, 将等差数列分解, 通过一个可做多种结构分解的因式说明构成三角形, 再证明互不相似, 且无穷。

证明: 当  $a_n^2, b_n^2, c_n^2$  成等差数列, 则  $b_n^2 - a_n^2 = c_n^2 - b_n^2$ ,

分解得:  $(b_n + a_n)(b_n - a_n) = (c_n + b_n)(c_n - b_n)$

选取关于  $n$  的一个多项式,  $4n(n^2 - 1)$  做两种途径的分解

$$4n(n^2 - 1) = (2n - 2)(2n^2 + 2n) = (2n^2 - 2n)(2n + 2) \quad 4n(n^2 - 1)$$

对比目标式, 构造  $\begin{cases} a_n = n^2 - 2n - 1 \\ b_n = n^2 + 1 \\ c_n = n^2 + 2n - 1 \end{cases} (n \geq 4)$ , 由第一问结论得, 等差数列成立,

考察三角形边长关系, 可构成三角形的三边。

下证互不相似。

任取正整数  $m, n$ , 若  $\triangle_m, \triangle_n$  相似: 则三边对应成比例

$$\frac{m^2 - 2m - 1}{n^2 - 2n - 1} = \frac{m^2 + 1}{n^2 + 1} = \frac{m^2 + 2m - 1}{n^2 + 2n - 1},$$

由比例的性质得:  $\frac{m-1}{n-1} = \frac{m+1}{n+1} \Rightarrow m=n$ , 与约定不同的值矛盾, 故互不相似。

