

2014年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标Ⅱ）

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共12小题，每小题5分，在每小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求.

1. (5分) 设集合 $M = \{0, 1, 2\}$, $N = \{x | x^2 - 3x + 2 \leq 0\}$, 则 $M \cap N =$ ()
- A. $\{1\}$ B. $\{2\}$ C. $\{0, 1\}$ D. $\{1, 2\}$

【考点】 1E: 交集及其运算.

【专题】 5J: 集合.

【分析】 求出集合N的元素, 利用集合的基本运算即可得到结论.

【解答】 解: $\because N = \{x | x^2 - 3x + 2 \leq 0\} = \{x | (x - 1)(x - 2) \leq 0\} = \{x | 1 \leq x \leq 2\}$,

$\therefore M \cap N = \{1, 2\}$,

故选: D.

【点评】 本题主要考查集合的基本运算, 比较基础.

2. (5分) 设复数 z_1, z_2 在复平面内的对应点关于虚轴对称, $z_1 = 2 + i$, 则 $z_1 z_2 =$ ()
- A. -5 B. 5 C. $-4 + i$ D. $-4 - i$

【考点】 A5: 复数的运算.

【专题】 5N: 数系的扩充和复数.

【分析】 根据复数的几何意义求出 z_2 , 即可得到结论.

【解答】 解: $z_1 = 2 + i$ 对应的点的坐标为 $(2, 1)$,

\because 复数 z_1, z_2 在复平面内的对应点关于虚轴对称,

$\therefore (2, 1)$ 关于虚轴对称的点的坐标为 $(-2, 1)$,

则对应的复数, $z_2 = -2 + i$,

则 $z_1 z_2 = (2 + i)(-2 + i) = i^2 - 4 = -1 - 4 = -5$,

故选: A.

【点评】 本题主要考查复数的基本运算，利用复数的几何意义是解决本题的关键，比较基础.

3. (5分) 设向量 \vec{a} , \vec{b} 满足 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{10}$, $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{6}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ ()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

【考点】 90: 平面向量数量积的性质及其运算.

【专题】 5A: 平面向量及应用.

【分析】 将等式进行平方, 相加即可得到结论.

【解答】 解: $\because |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{10}$, $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{6}$,

\therefore 分别平方得 $\vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 = 10$, $\vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 = 6$,

两式相减得 $4\vec{a} \cdot \vec{b} = 10 - 6 = 4$,

即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$,

故选: A.

【点评】 本题主要考查向量的基本运算, 利用平方进行相加是解决本题的关键, 比较基础.

4. (5分) 钝角三角形ABC的面积是 $\frac{1}{2}$, $AB=1$, $BC=\sqrt{2}$, 则 $AC=$ ()
- A. 5 B. $\sqrt{5}$ C. 2 D. 1

【考点】 HR: 余弦定理.

【专题】 56: 三角函数的求值.

【分析】 利用三角形面积公式列出关系式, 将已知面积, AB , BC 的值代入求出 $\sin B$ 的值, 分两种情况考虑: 当 B 为钝角时; 当 B 为锐角时, 利用同角三角函数间的基本关系求出 $\cos B$ 的值, 利用余弦定理求出 AC 的值即可.

【解答】 解: \because 钝角三角形ABC的面积是 $\frac{1}{2}$, $AB=c=1$, $BC=a=\sqrt{2}$,

$\therefore S = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2}$, 即 $\sin B = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

当B为钝角时， $\cos B = -\sqrt{1-\sin^2 B} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，

利用余弦定理得： $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos B = 1 + 2 + 2 = 5$ ，即 $AC = \sqrt{5}$ ，

当B为锐角时， $\cos B = \sqrt{1-\sin^2 B} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，

利用余弦定理得： $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos B = 1 + 2 - 2 = 1$ ，即 $AC = 1$ ，

此时 $AB^2 + AC^2 = BC^2$ ，即 $\triangle ABC$ 为直角三角形，不合题意，舍去，

则 $AC = \sqrt{5}$ 。

故选：B。

【点评】此题考查了余弦定理，三角形面积公式，以及同角三角函数间的基本关系，熟练掌握余弦定理是解本题的关键。

5. (5分) 某地区空气质量监测资料表明，一天的空气质量为优良的概率是0.75，连续两天为优良的概率是0.6，已知某天的空气质量为优良，则随后一天的空气质量为优良的概率是 ()

- A. 0.8 B. 0.75 C. 0.6 D. 0.45

【考点】C8：相互独立事件和相互独立事件的概率乘法公式。

【专题】51：概率与统计。

【分析】设随后一天的空气质量为优良的概率为p，则由题意可得 $0.75 \times p = 0.6$ ，由此解得p的值。


【解答】解：设随后一天的空气质量为优良的概率为p，则由题意可得 $0.75 \times p = 0.6$ ，

解得 $p = 0.8$ ，

故选：A。

【点评】本题主要考查相互独立事件的概率乘法公式的应用，属于基础题。

6. (5分) 如图，网格纸上正方形小格的边长为1 (表示1cm)，图中粗线画出的是某零件的三视图，该零件由一个底面半径为3cm，高为6cm的圆柱体毛坯切削得到，则切削掉部分的体积与原来毛坯体积的比值为 ()



A. $\frac{17}{27}$

B. $\frac{5}{9}$

C. $\frac{10}{27}$


D. $\frac{1}{3}$

【考点】 L1: 由三视图求面积、体积.

【专题】 5F: 空间位置关系与距离.

【分析】 由三视图判断几何体的形状，通过三视图的数据求解几何体的体积即可.

【解答】 解：几何体是由两个圆柱组成，一个是底面半径为3高为2，一个是底面半径为2，高为4，



组合体体积是： $3^2\pi \cdot 2 + 2^2\pi \cdot 4 = 34\pi$.


底面半径为3cm，高为6cm的圆柱体毛坯的体积为： $3^2\pi \times 6 = 54\pi$

切削掉部分的体积与原来毛坯体积的比值为： $\frac{54\pi - 34\pi}{54\pi} = \frac{10}{27}$.

故选：C.

【点评】 本题考查三视图与几何体的关系，几何体的体积的求法，考查空间想象能力以及计算能力.

7. (5分) 执行如图所示的程序框图，若输入的x，t均为2，则输出的S= ()



- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

【考点】 EF: 程序框图.

【专题】 5K: 算法和程序框图.

【分析】 根据条件, 依次运行程序, 即可得到结论.

【解答】 解: 若 $x=t=2$,

则第一次循环, $1 \leq 2$ 成立, 则 $M = \frac{1}{1} \times 2 = 2$, $S = 2 + 3 = 5$, $k = 2$,

第二次循环, $2 \leq 2$ 成立, 则 $M = \frac{2}{2} \times 2 = 2$, $S = 2 + 5 = 7$, $k = 3$,

此时 $3 \leq 2$ 不成立, 输出 $S = 7$,

故选: D.

【点评】 本题主要考查程序框图的识别和判断, 比较基础.

8. (5分) 设曲线 $y = ax - \ln(x+1)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 $y = 2x$, 则 $a =$ ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【考点】 6H: 利用导数研究曲线上某点切线方程.

【专题】52: 导数的概念及应用.

【分析】根据导数的几何意义, 即 $f'(x_0)$ 表示曲线 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的切线斜率, 再代入计算.

【解答】解: $y' = a - \frac{1}{x+1}$,

$$\therefore y'(0) = a - 1 = 2,$$

$$\therefore a = 3.$$

故选: D.

【点评】本题是基础题, 考查的是导数的几何意义, 这个知识点在高考中是经常考查的内容, 一般只要求导正确, 就能够求解该题. 在高考中, 导数作为一个非常好的研究工具, 经常会被考查到, 特别是用导数研究最值, 证明不等式, 研究零点问题等等经常以大题的形式出现, 学生在复习时要引起重视.

9. (5分) 设 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x+y-7 \leq 0 \\ x-3y+1 \leq 0 \\ 3x-y-5 \geq 0 \end{cases}$$
, 则 $z=2x-y$ 的最大值为 ()

A. 10

B. 8

C. 3

D. 2

【考点】7C: 简单线性规划.

【专题】59: 不等式的解法及应用.

【分析】作出不等式组对应的平面区域, 利用目标函数的几何意义, 利用数形结合确定 z 的最大值.

【解答】解: 作出不等式组对应的平面区域如图: (阴影部分ABC).

$$\text{由 } z=2x-y \text{ 得 } y=2x-z,$$

$$\text{平移直线 } y=2x-z,$$

由图象可知当直线 $y=2x-z$ 经过点C时, 直线 $y=2x-z$ 的截距最小,


此时 z 最大.

$$\text{由 } \begin{cases} x+y-7=0 \\ x-3y+1=0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x=5 \\ y=2 \end{cases}, \text{ 即 } C(5, 2)$$

代入目标函数 $z=2x-y$,

得 $z=2\times 5-2=8$.

故选：B.



【点评】 本题主要考查线性规划的应用，结合目标函数的几何意义，利用数形结合的数学思想是解决此类问题的基本方法.

10. (5分) 设F为抛物线C: $y^2=3x$ 的焦点，过F且倾斜角为 30° 的直线交C于A, B两点，O为坐标原点，则 $\triangle OAB$ 的面积为 ()

- A. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ B. $\frac{9\sqrt{3}}{8}$ C. $\frac{63}{32}$ D. $\frac{9}{4}$

【考点】 K8: 抛物线的性质.

【专题】 5D: 圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】 由抛物线方程求出焦点坐标，由直线的倾斜角求出斜率，写出过A, B两点的直线方程，和抛物线方程联立后化为关于y的一元二次方程，由根与系数关系得到A, B两点纵坐标的和与积，把 $\triangle OAB$ 的面积表示为两个小三角形AOF与BOF的面积和得答案.

【解答】 解：由 $y^2=2px$ ，得 $2p=3$ ， $p=\frac{3}{2}$ ，

则F $(\frac{3}{4}, 0)$.

\therefore 过A, B的直线方程为 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x-\frac{3}{4})$,

即 $x=\sqrt{3}y+\frac{3}{4}$.

$$\text{联立} \begin{cases} y^2=3x \\ x=\sqrt{3y}+\frac{3}{4} \end{cases}, \text{得} 4y^2-12\sqrt{3}y-9=0.$$

设A (x_1, y_1) , B (x_2, y_2) ,

$$\text{则} y_1+y_2=3\sqrt{3}, y_1y_2=-\frac{9}{4}.$$

$$\therefore S_{\triangle OAB}=S_{\triangle OAF}+S_{\triangle OFB}=\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}|y_1-y_2|=\frac{3}{8}\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\frac{3}{8}\times\sqrt{(3\sqrt{3})^2+9}=\frac{9}{4}.$$

故选: D.

【点评】 本题考查直线与抛物线的位置关系, 考查数学转化思想方法, 涉及直线和圆锥曲线关系问题, 常采用联立直线和圆锥曲线, 然后利用一元二次方程的根与系数关系解题, 是中档题.

11. (5分) 直三棱柱ABC - $A_1B_1C_1$ 中, $\angle BCA=90^\circ$, M, N分别是 A_1B_1 , A_1C_1 的中点, $BC=CA=CC_1$, 则BM与AN所成角的余弦值为 ()

- A. $\frac{1}{10}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{\sqrt{30}}{10}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【考点】 LM: 异面直线及其所成的角.

【专题】 5F: 空间位置关系与距离.

【分析】 画出图形, 找出BM与AN所成角的平面角, 利用解三角形求出BM与AN所成角的余弦值.

【解答】 解: 直三棱柱ABC - $A_1B_1C_1$ 中, $\angle BCA=90^\circ$, M, N分别是 A_1B_1 , A_1C_1 的中点, 如图: BC 的中点为O, 连结ON,


$MN \parallel \frac{1}{2}B_1C_1=OB$, 则MNOB是平行四边形, BM与AN所成角就是 $\angle ANO$,

$\because BC=CA=CC_1$,

设 $BC=CA=CC_1=2$, $\therefore CO=1$, $AO=\sqrt{5}$, $AN=\sqrt{5}$, $MB=\sqrt{B_1M^2+BB_1^2}=\sqrt{(\sqrt{2})^2+2^2}=\sqrt{6}$,

在 $\triangle ANO$ 中, 由余弦定理可得: $\cos\angle ANO=\frac{AN^2+NO^2-AO^2}{2AN\cdot NO}=\frac{6}{2\times\sqrt{5}\times\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{30}}{10}$.

故选: C.



【点评】 本题考查异面直线对称角的求法，作出异面直线所成角的平面角是解题的关键，同时考查余弦定理的应用。

12. (5分) 设函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin \frac{\pi x}{m}$ ，若存在 $f(x)$ 的极值点 x_0 满足 $x_0^2 + [f(x_0)]^2 < m^2$ ，则 m 的取值范围是 ()
- A. $(-\infty, -6) \cup (6, +\infty)$ B. $(-\infty, -4) \cup (4, +\infty)$
 C. $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【考点】 H4: 正弦函数的定义域和值域.

【专题】 57: 三角函数的图像与性质.

【分析】 由题意可得， $f(x_0) = \pm\sqrt{3}$ ，且

$$\frac{\pi x_0}{m} = k\pi + \frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

再由题意可得当 m^2 最小时， $|x_0|$ 最小，而 $|x_0|$ 最小为 $\frac{1}{2}|m|$ ，可得 $m^2 > \frac{1}{4}m^2 + 3$ ，由此求得 m 的取值范围.

【解答】 解：由题意可得， $f(x_0) = \pm\sqrt{3}$ ，即 $\frac{\pi x_0}{m} = k\pi + \frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$ ，即

$$x_0 = \frac{2k+1}{2}m.$$

再由 $x_0^2 + [f(x_0)]^2 < m^2$ ，即 $x_0^2 + 3 < m^2$ ，可得当 m^2 最小时， $|x_0|$ 最小，而 $|x_0|$ 最小为 $\frac{1}{2}|m|$ ，

$$\therefore m^2 > \frac{1}{4}m^2 + 3, \quad \therefore m^2 > 4.$$

求得 $m > 2$ ，或 $m < -2$ ，

故选：C.

【点评】 本题主要正弦函数的图象和性质，函数的零点的定义，体现了转化的

数学思想，属于中档题.

二、填空题：本大题共4小题，每小题5分.（第13题~第21题为必考题，每个试题考生都必须作答，第22题~第24题为选考题，考生根据要求作答）

13. （5分） $(x+a)^{10}$ 的展开式中， x^7 的系数为15，则 $a=\underline{\underline{\frac{1}{2}}}$.

【考点】DA：二项式定理.

【专题】5P：二项式定理.

【分析】在二项展开式的通项公式中，令 x 的幂指数等于3，求出 r 的值，即可求得 x^7 的系数，再根据 x^7 的系数为15，求得 a 的值.

【解答】解： $(x+a)^{10}$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1}=\mathrm{C}_{10}^r \cdot x^{10-r} \cdot a^r$,

令 $10-r=7$ ，求得 $r=3$ ，可得 x^7 的系数为 $a^3 \cdot \mathrm{C}_{10}^3=120a^3=15$,

$$\therefore a=\frac{1}{2},$$

故答案为： $\frac{1}{2}$.

【点评】本题主要考查二项式定理的应用，二项展开式的通项公式，求展开式中某项的系数，二项式系数的性质，属于中档题.

14. （5分）函数 $f(x)=\sin(x+2\phi)-2\sin\phi\cos(x+\phi)$ 的最大值为1.

【考点】GP：两角和与差的三角函数；HW：三角函数的最值.

【专题】56：三角函数的求值.

【分析】由条件利用两角和差的正弦公式、余弦公式化简函数的解析式为 $f(x)=\sin x$ ，从而求得函数的最大值.

【解答】解：函数 $f(x)=\sin(x+2\phi)-2\sin\phi\cos(x+\phi)=\sin[(x+\phi)+\phi]-2\sin\phi\cos(x+\phi)$
 $=\sin(x+\phi)\cos\phi+\cos(x+\phi)\sin\phi-2\sin\phi\cos(x+\phi)=\sin(x+\phi)\cos\phi-\cos(x+\phi)\sin\phi$
 $=\sin[(x+\phi)-\phi]=\sin x,$

故函数 $f(x)$ 的最大值为1,

故答案为: 1.

【点评】 本题主要考查两角和差的正弦公式、余弦公式的应用, 正弦函数的最值, 属于中档题.

15. (5分) 已知偶函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递减, $f(2)=0$, 若 $f(x-1) > 0$, 则 x 的取值范围是 $(-1, 3)$.

【考点】 3N: 奇偶性与单调性的综合.

【专题】 51: 函数的性质及应用.

【分析】 根据函数奇偶性和单调性之间的关系将不等式等价转化为 $f(|x-1|) > f(2)$, 即可得到结论.

【解答】 解: \because 偶函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递减, $f(2)=0$,

\therefore 不等式 $f(x-1) > 0$ 等价于 $f(x-1) > f(2)$,

即 $f(|x-1|) > f(2)$,

$\therefore |x-1| < 2$,

解得 $-1 < x < 3$,

故答案为: $(-1, 3)$

【点评】 本题主要考查函数奇偶性和单调性之间的关系的的应用, 将不等式等价转化为 $f(|x-1|) > f(2)$ 是解决本题的关键.

16. (5分) 设点 $M(x_0, 1)$, 若在圆 $O: x^2+y^2=1$ 上存在点 N , 使得 $\angle OMN=45^\circ$, 则 x_0 的取值范围是 $[-1, 1]$.

【考点】 J9: 直线与圆的位置关系.


【专题】 5B: 直线与圆.

【分析】 根据直线和圆的位置关系, 画出图形, 利用数形结合即可得到结论.

【解答】 解: 由题意画出图形如图: 点 $M(x_0, 1)$,

要使圆 $O: x^2+y^2=1$ 上存在点 N , 使得 $\angle OMN=45^\circ$,

则 $\angle OMN$ 的最大值大于或等于 45° 时一定存在点 N ，使得 $\angle OMN=45^\circ$ ，
 而当 MN 与圆相切时 $\angle OMN$ 取得最大值，
 此时 $MN=1$ ，
 图中只有 M' 到 M'' 之间的区域满足 $MN \leq 1$ ，
 $\therefore x_0$ 的取值范围是 $[-1, 1]$ 。



【点评】 本题考查直线与圆的位置关系，直线与直线设出角的求法，数形结合是快速解得本题的策略之一。

三、解答题：解答应写出文字说明，证明过程或验算步骤。

17. (12分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$ ， $a_{n+1}=3a_n+1$ 。

(I) 证明 $\{a_n + \frac{1}{2}\}$ 是等比数列，并求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(II) 证明： $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} < \frac{3}{2}$ 。

【考点】 87：等比数列的性质；8E：数列的求和。

【专题】 14：证明题；54：等差数列与等比数列。

【分析】 (I) 根据等比数列的定义，后一项与前一项的比是常数，即 $\frac{b_{n+1}}{b_n} =$

常数，又首项不为0，所以为等比数列；

再根据等比数列的通项化式，求出 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(II) 将 $\frac{1}{a_n}$ 进行放大，即将分母缩小，使得构成一个等比数列，从而求和，证

明不等式.

【解答】证明 (I)
$$\frac{a_{n+1} + \frac{1}{2}}{a_n + \frac{1}{2}} = \frac{3a_n + 1 + \frac{1}{2}}{a_n + \frac{1}{2}} = \frac{3(a_n + \frac{1}{2})}{a_n + \frac{1}{2}} = 3,$$

$$\because a_1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \neq 0,$$

\therefore 数列 $\{a_n + \frac{1}{2}\}$ 是以首项为 $\frac{3}{2}$, 公比为 3 的等比数列;

$$\therefore a_n + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \times 3^{n-1} = \frac{3^n}{2}, \text{ 即 } a_n = \frac{3^n - 1}{2};$$

(II) 由 (I) 知
$$\frac{1}{a_n} = \frac{2}{3^n - 1},$$

当 $n \geq 2$ 时, $\because 3^n - 1 > 3^n - 3^{n-1}, \therefore \frac{1}{a_n} = \frac{2}{3^n - 1} < \frac{2}{3^n - 3^{n-1}} = \frac{1}{3^{n-1}},$

\therefore 当 $n=1$ 时, $\frac{1}{a_1} = 1 < \frac{3}{2}$ 成立,

当 $n \geq 2$ 时,
$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} < 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{3^{n-1}} = \frac{1 - (\frac{1}{3})^n}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2} (1 - \frac{1}{3^n}) < \frac{3}{2}.$$

\therefore 对 $n \in \mathbb{N}_+$ 时, $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} < \frac{3}{2}.$


【点评】 本题考查的是等比数列, 用放缩法证明不等式, 证明数列为等比数列, 只需要根据等比数列的定义就行; 数列与不等式常结合在一起考, 放缩法是常用的方法之一,

通过放大或缩小, 使原数列变成一个等比数列, 或可以用裂项相消法求和的新数列. 属于中档题.

18. (12分) 如图, 四棱锥 $P - ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, E 为 PD 的中点.

(I) 证明: $PB \parallel$ 平面 AEC ;

(II) 设二面角 $D - AE - C$ 为 60° , $AP=1$, $AD=\sqrt{3}$, 求三棱锥 $E - ACD$ 的体积.



【考点】 LF: 棱柱、棱锥、棱台的体积; LS: 直线与平面平行; MJ: 二面角的平面角及求法.

【专题】 5F: 空间位置关系与距离.

【分析】 (I) 连接BD交AC于O点, 连接EO, 只要证明 $EO \parallel PB$, 即可证明 $PB \parallel$ 平面AEC;

(II) 延长AE至M连结DM, 使得 $AM \perp DM$, 说明 $\angle CMD = 60^\circ$, 是二面角的平面角, 求出CD, 即可三棱锥E - ACD的体积.

【解答】 (I) 证明: 连接BD交AC于O点, 连接EO,

\because O为BD中点, E为PD中点,

$\therefore EO \parallel PB$, (2分)

$EO \subset$ 平面AEC, $PB \not\subset$ 平面AEC, 所以 $PB \parallel$ 平面AEC; (6分)

(II) 解: 延长AE至M连结DM, 使得 $AM \perp DM$,

\because 四棱锥P - ABCD中, 底面ABCD为矩形, $PA \perp$ 平面ABCD,

$\therefore CD \perp$ 平面AMD,

$\therefore CD \perp MD$.

\because 二面角D - AE - C为 60° ,

$\therefore \angle CMD = 60^\circ$,

$\because AP = 1, AD = \sqrt{3}, \angle ADP = 30^\circ$,



$\therefore PD = 2$,

E为PD的中点. $AE = 1$,

$\therefore DM = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

$CD = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \tan 60^\circ = \frac{3}{2}$.

三棱锥E - ACD的体积为: $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} AD \cdot CD \cdot \frac{1}{2} PA = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{\sqrt{3}}{8}$.



【点评】 本题考查直线与平面平行的判定，几何体的体积的求法，二面角等指数的应用，考查逻辑思维能力，是中档题.

19. (12分) 某地区2007年至2013年农村居民家庭人均纯收入 y (单位: 千元) 的数据如表:

年份	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
年份代号 t	1	2	3	4	5	6	7
人均纯收入 y	2.9	3.3	3.6	4.4	4.8	5.2	5.9

(I) 求 y 关于 t 的线性回归方程;

(II) 利用(I)中的回归方程, 分析2007年至2013年该地区农村居民家庭人均纯收入的变化情况, 并预测该地区2015年农村居民家庭人均纯收入.

附: 回归直线的斜率和截距的最小二乘估计公式分别为: $\hat{b} =$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t}.$$

【考点】 BK: 线性回归方程.

【专题】 11: 计算题; 51: 概率与统计.

【分析】 (I) 根据所给的数据, 利用最小二乘法可得横标和纵标的平均数, 横标和纵标的积的和, 与横标的平方和, 代入公式求出b的值, 再求出a的值, 写出线性回归方程.

(II) 根据上一问做出的线性回归方程, 代入所给的t的值, 预测该地区2015年农村居民家庭人均纯收入, 这是一个估计值.

【解答】 解: (I) 由题意, $\bar{t} = \frac{1}{7} \times (1+2+3+4+5+6+7) = 4$,

$$\bar{y} = \frac{1}{7} \times (2.9+3.3+3.6+4.4+4.8+5.2+5.9) = 4.3,$$

$$\begin{aligned} \therefore \hat{b} &= \frac{(-3) \times (-1.4) + (-2) \times (-1) + (-1) \times (-0.7) + 0 \times 0.1 + 1 \times 0.5 + 2 \times 0.9 + 3 \times 1.4}{9+4+1+0+1+4+9} \\ &= \frac{14}{28} = 0.5, \end{aligned}$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t} = 4.3 - 0.5 \times 4 = 2.3.$$

$\therefore y$ 关于t的线性回归方程为 $\hat{y} = 0.5t + 2.3$;

(II) 由(I)知, $b = 0.5 > 0$, 故2007年至2013年该地区农村居民家庭人均纯收入逐年增加, 平均每年增加0.5千元.

将2015年的年份代号t=9代入 $\hat{y} = 0.5t + 2.3$, 得:

$$\hat{y} = 0.5 \times 9 + 2.3 = 6.8,$$

故预测该地区2015年农村居民家庭人均纯收入为6.8千元.

【点评】 本题考查线性回归分析的应用, 本题解题的关键是利用最小二乘法认真做出线性回归方程的系数, 这是整个题目做对的必备条件, 本题是一个基础题.

20. (12分) 设 F_1, F_2 分别是 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左, 右焦点, M是C上

一点且 MF_2 与x轴垂直, 直线 MF_1 与C的另一个交点为N.

(1) 若直线MN的斜率为 $\frac{3}{4}$ ，求C的离心率；

(2) 若直线MN在y轴上的截距为2，且 $|MN|=5|F_1N|$ ，求a, b.

【考点】 K4: 椭圆的性质.

【专题】 5E: 圆锥曲线中的最值与范围问题.

【分析】 (1) 根据条件求出M的坐标，利用直线MN的斜率为 $\frac{3}{4}$ ，建立关于a,

c的方程即可求C的离心率；

(2) 根据直线MN在y轴上的截距为2，以及 $|MN|=5|F_1N|$ ，建立方程组关系，
求出N的坐标，代入椭圆方程即可得到结论.

【解答】 解：(1) \because M是C上一点且 MF_2 与x轴垂直，

\therefore M的横坐标为c，当 $x=c$ 时， $y=\frac{b^2}{a}$ ，即 $M(c, \frac{b^2}{a})$ ，

若直线MN的斜率为 $\frac{3}{4}$ ，

$$\text{即} \tan \angle MF_1F_2 = \frac{\frac{b^2}{a}}{2c} = \frac{b^2}{2ac} = \frac{3}{4},$$

$$\text{即} b^2 = \frac{3}{2}ac = a^2 - c^2,$$

$$\text{即} c^2 + \frac{3}{2}ac - a^2 = 0,$$

$$\text{则} e^2 + \frac{3}{2}e - 1 = 0,$$

$$\text{即} 2e^2 + 3e - 2 = 0$$

$$\text{解得} e = \frac{1}{2} \text{ 或 } e = -2 \text{ (舍去)},$$

$$\text{即} e = \frac{1}{2}.$$

(II) 由题意，原点O是 F_1F_2 的中点，则直线 MF_1 与y轴的交点D(0, 2)是线段
 MF_1 的中点，

设 $M(c, y)$ ，($y > 0$)，

$$\text{则} \frac{c^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \text{ 即 } y^2 = \frac{b^4}{a^2}, \text{ 解得 } y = \frac{b^2}{a},$$

\therefore OD是 $\triangle MF_1F_2$ 的中位线，

$$\therefore \frac{b^2}{a} = 4, \text{ 即 } b^2 = 4a,$$

$$\text{由 } |MN| = 5|F_1N|,$$

$$\text{则 } |MF_1| = 4|F_1N|,$$

$$\text{解得 } |DF_1| = 2|F_1N|,$$

$$\text{即 } \overrightarrow{DF_1} = 2\overrightarrow{F_1N}$$

设 $N(x_1, y_1)$, 由题意知 $y_1 < 0$,


$$\text{则 } (-c, -2) = 2(x_1 + c, y_1).$$

$$\text{即 } \begin{cases} 2(x_1 + c) = -c \\ 2y_1 = -2 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} x_1 = -\frac{3}{2}c \\ y_1 = -1 \end{cases}$$

$$\text{代入椭圆方程得 } \frac{9c^2}{4a^2} + \frac{1}{b^2} = 1,$$

$$\text{将 } b^2 = 4a \text{ 代入得 } \frac{9(a^2 - 4a)}{4a^2} + \frac{1}{4a} = 1,$$

$$\text{解得 } a = 7, b = 2\sqrt{7}.$$



【点评】 本题主要考查椭圆的性质，利用条件建立方程组，利用待定系数法是解决本题的关键，综合性较强，运算量较大，有一定的难度。

21. (12分) 已知函数 $f(x) = e^x - e^{-x} - 2x$.

(I) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(II) 设 $g(x) = f(2x) - 4bf(x)$, 当 $x > 0$ 时, $g(x) > 0$, 求 b 的最大值;

(III) 已知 $1.4142 < \sqrt{2} < 1.4143$, 估计 $\ln 2$ 的近似值 (精确到 0.001).

【考点】6B: 利用导数研究函数的单调性.

【专题】16: 压轴题; 53: 导数的综合应用.

【分析】对第(Ⅰ)问, 直接求导后, 利用基本不等式可达到目的;

对第(Ⅱ)问, 先验证 $g(0)=0$, 只需说明 $g(x)$ 在 $[0+\infty)$ 上为增函数即可,

从而问题转化为“判断 $g'(x)>0$ 是否成立”的问题;

对第(Ⅲ)问, 根据第(Ⅱ)问的结论, 设法利用 $\sqrt{2}$ 的近似值, 并寻求 $\ln 2$,

于是在 $b=2$ 及 $b>2$ 的情况下分别计算 $g(\ln\sqrt{2})$, 最后可估计 $\ln 2$ 的近似值.

【解答】解: (Ⅰ) 由 $f(x)$ 得 $f'(x)=e^x+e^{-x}-2 \geq 2\sqrt{e^x \cdot e^{-x}}-2=0$,

即 $f'(x) \geq 0$, 当且仅当 $e^x=e^{-x}$ 即 $x=0$ 时, $f'(x)=0$,

\therefore 函数 $f(x)$ 在 \mathbb{R} 上为增函数.

(Ⅱ) $g(x)=f(2x)-4bf(x)=e^{2x}-e^{-2x}-4b(e^x-e^{-x})+(8b-4)x$,

则 $g'(x)=2[e^{2x}+e^{-2x}-2b(e^x+e^{-x})+(4b-2)]$

$=2[(e^x+e^{-x})^2-2b(e^x+e^{-x})+(4b-4)]$

$=2(e^x+e^{-x}-2)(e^x+e^{-x}+2-2b)$.

① $\because e^x+e^{-x}>2, e^x+e^{-x}+2>4$,

\therefore 当 $2b \leq 4$, 即 $b \leq 2$ 时, $g'(x) \geq 0$, 当且仅当 $x=0$ 时取等号,

从而 $g(x)$ 在 \mathbb{R} 上为增函数, 而 $g(0)=0$,

$\therefore x>0$ 时, $g(x)>0$, 符合题意.

②当 $b>2$ 时, 若 x 满足 $2 < e^x+e^{-x} < 2b-2$ 即 $\begin{cases} 2 < e^x+e^{-x} \\ e^x+e^{-x} < 2b-2 \end{cases}$, 得

$\ln(b-1-\sqrt{b^2-2b}) < x < \ln(b-1+\sqrt{b^2-2b})$, 此时, $g'(x) < 0$,

又由 $g(0)=0$ 知, 当 $0 < x \leq \ln(b-1+\sqrt{b^2-2b})$ 时, $g(x) < 0$, 不符合题意.

综合①、②知, $b \leq 2$, 得 b 的最大值为2.

(Ⅲ) $\because 1.4142 < \sqrt{2} < 1.4143$, 根据(Ⅱ)中 $g(x)=e^{2x}-e^{-2x}-4b(e^x-e^{-x})+(8b-4)x$,

为了凑配 $\ln 2$, 并利用 $\sqrt{2}$ 的近似值, 故将 $\ln\sqrt{2}$ 即 $\frac{1}{2}\ln 2$ 代入 $g(x)$ 的解析式中,

得 $g(\ln\sqrt{2})=\frac{3}{2}-2\sqrt{2}b+2(2b-1)\ln 2$.

当 $b=2$ 时, 由 $g(x) > 0$, 得 $g(\ln\sqrt{2}) = \frac{3}{2} - 4\sqrt{2} + 6\ln 2 > 0$,

从而 $\ln 2 > \frac{8\sqrt{2}-3}{12} > \frac{8 \times 1.4142 - 3}{12} = 0.6928$;

令 $\ln(b-1+\sqrt{b^2-2b}) = \ln\sqrt{2}$, 得 $b = \frac{3\sqrt{2}}{4} + 1 > 2$, 当 $0 < x \leq \ln(b-1+\sqrt{b^2-2b})$ 时,

由 $g(x) < 0$, 得 $g(\ln\sqrt{2}) = -\frac{3}{2} - 2\sqrt{2} + (3\sqrt{2}+2)\ln 2 < 0$, 得

$$\ln 2 < \frac{18+\sqrt{2}}{28} < \frac{18+1.4143}{28} < 0.6934.$$

所以 $\ln 2$ 的近似值为0.693.

【点评】 1. 本题三个小题的难度逐步增大, 考查了学生对函数单调性深层次的把握能力, 对思维的要求较高, 属压轴题.

2. 从求解过程来看, 对导函数解析式的合理变形至关重要, 因为这直接影响到对导数符号的判断, 是解决本题的一个重要突破口.


3. 本题的难点在于如何寻求 $\ln 2$, 关键是根据第(2)问中 $g(x)$ 的解析式探究 b 的值, 从而获得不等式, 这样自然地将不等式放缩为 $\sqrt{2}$ 的范围的端点值, 达到了估值的目的.

请考生在第22、23、24三题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分, 作答时请写清题号. **【选修4-1: 几何证明选讲】**

22. (10分) 如图, P 是 $\odot O$ 外一点, PA 是切线, A 为切点, 割线 PBC 与 $\odot O$ 相交于点 B, C , $PC=2PA$, D 为 PC 的中点, AD 的延长线交 $\odot O$ 于点 E , 证明:

(I) $BE=EC$;

(II) $AD \cdot DE = 2PB^2$.



【考点】 N4: 相似三角形的判定; NC: 与圆有关的比例线段.

【专题】 17: 选作题; 5Q: 立体几何.

【分析】（Ⅰ）连接OE，OA，证明 $OE \perp BC$ ，可得E是 \widehat{BC} 的中点，从而 $BE=EC$ ；

（Ⅱ）利用切割线定理证明 $PD=2PB$ ， $PB=BD$ ，结合相交弦定理可得 $AD \cdot DE=2PB^2$

【解答】证明：（Ⅰ）连接OE，OA，则 $\angle OAE=\angle OEA$ ， $\angle OAP=90^\circ$ ，

$\because PC=2PA$ ，D为PC的中点，

$\therefore PA=PD$ ，

$\therefore \angle PAD=\angle PDA$ ，

$\because \angle PDA=\angle CDE$ ，

$\therefore \angle OEA+\angle CDE=\angle OAE+\angle PAD=90^\circ$ ，

$\therefore OE \perp BC$ ，

$\therefore E$ 是 \widehat{BC} 的中点，

$\therefore BE=EC$ ；

（Ⅱ） $\because PA$ 是切线，A为切点，割线PBC与 $\odot O$ 相交于点B，C，

$\therefore PA^2=PB \cdot PC$ ，

$\because PC=2PA$ ，

$\therefore PA=2PB$ ，


$\therefore PD=2PB$ ，

$\therefore PB=BD$ ，

$\therefore BD \cdot DC=PB \cdot 2PB$ ，

$\therefore AD \cdot DE=BD \cdot DC$ ，

$\therefore AD \cdot DE=2PB^2$ 。



【点评】 本题考查与圆有关的比例线段，考查切割线定理、相交弦定理，考查学生分析解决问题的能力，属于中档题。

【选修4-4：坐标系与参数方程】

23. 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，半圆 C 的极坐标方程为 $\rho=2\cos\theta$ ， $\theta\in[0, \frac{\pi}{2}]$

(I) 求 C 的参数方程；

(II) 设点 D 在半圆 C 上，半圆 C 在 D 处的切线与直线 $l: y=\sqrt{3}x+2$ 垂直，根据(1)中你得到的参数方程，求直线 CD 的倾斜角及 D 的坐标.

【考点】QH：参数方程化成普通方程.

【专题】5S：坐标系和参数方程.

【分析】(1) 利用 $\begin{cases} \rho^2 = x^2 + y^2 \\ x = \rho \cos \theta \end{cases}$ 即可得出直角坐标方程，利用 $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ 进

而得出参数方程.

(2) 利用半圆 C 在 D 处的切线与直线 $l: y=\sqrt{3}x+2$ 垂直，则直线 CD 的斜率与直线 l 的斜率相等，即可得出直线 CD 的倾斜角及 D 的坐标.

【解答】解：(1) 由半圆 C 的极坐标方程为 $\rho=2\cos\theta$ ， $\theta\in[0, \frac{\pi}{2}]$ ，即 $\rho^2=2\rho\cos\theta$ ，可得 C 的普通方程为 $(x-1)^2+y^2=1$ ($0\leq y\leq 1$).

可得 C 的参数方程为 $\begin{cases} x=1+\cos t \\ y=\sin t \end{cases}$ (t 为参数， $0\leq t\leq\pi$).

(2) 设 $D(1+\cos t, \sin t)$ ，

由(1)知 C 是以 $C(1, 0)$ 为圆心，1为半径的上半圆，

\therefore 直线 CD 的斜率与直线 l 的斜率相等， $\therefore \tan t = \sqrt{3}$ ， $t = \frac{\pi}{3}$.

故 D 的直角坐标为 $(1+\cos \frac{\pi}{3}, \sin \frac{\pi}{3})$ ，即 $(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$.

【点评】本题考查了把极坐标方程化为直角坐标方程、参数方程化为普通方程、直线与圆的位置关系，考查了推理能力与计算能力，属于中档题.

六、解答题 (共1小题，满分0分)

24. 设函数 $f(x) = |x + \frac{1}{a}| + |x - a|$ ($a > 0$).

(I) 证明： $f(x) \geq 2$;

(II) 若 $f(3) < 5$, 求 a 的取值范围.

【考点】 R5: 绝对值不等式的解法.

【专题】 59: 不等式的解法及应用.

【分析】 (I) 由 $a > 0$, $f(x) = |x + \frac{1}{a}| + |x - a|$, 利用绝对值三角不等式、基本不等式证得 $f(x) \geq 2$ 成立.

(II) 由 $f(3) = |3 + \frac{1}{a}| + |3 - a| < 5$, 分当 $a > 3$ 时和当 $0 < a \leq 3$ 时两种情况, 分别去掉绝对值, 求得不等式的解集, 再取并集, 即得所求.

【解答】 解: (I) 证明: $\because a > 0$, $f(x) = |x + \frac{1}{a}| + |x - a| \geq |(x + \frac{1}{a}) - (x - a)| = |a + \frac{1}{a}| = a + \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{a \cdot \frac{1}{a}} = 2$,

故不等式 $f(x) \geq 2$ 成立.

(II) $\because f(3) = |3 + \frac{1}{a}| + |3 - a| < 5$,

\therefore 当 $a > 3$ 时, 不等式即 $a + \frac{1}{a} < 5$, 即 $a^2 - 5a + 1 < 0$, 解得 $3 < a < \frac{5 + \sqrt{21}}{2}$.

当 $0 < a \leq 3$ 时, 不等式即 $6 - a + \frac{1}{a} < 5$, 即 $a^2 - a - 1 > 0$, 求得 $\frac{1 + \sqrt{5}}{2} < a \leq 3$.

综上可得, a 的取值范围 $(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{5 + \sqrt{21}}{2})$.

【点评】 本题主要考查绝对值三角不等式, 绝对值不等式的解法, 体现了转化、分类讨论的数学思想, 属于中档题.