

## 2005 年贵州高考理科数学真题及答案

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，共 150 分。考试时间 120 分钟。

### 第 I 卷

参考公式：

如果事件 A、B 互斥，那么

$$P(A+B) = P(A) + P(B)$$

如果事件 A、B 相互独立，那么

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$$

如果事件 A 在一次试验中发生的概率是 P，那么

n 次独立重复试验中恰好发生 k 次的概率

$$P_n(k) = C_n^k P^k (1-P)^{n-k}$$

球的表面积公式

$$S = 4\pi R^2$$

其中 R 表示球的半径，

球的体积公式

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3,$$

其中 R 表示球的半径

一、选择题：

(1) 已知  $\alpha$  为第三象限角，则  $\frac{\alpha}{2}$  所在的象限是

(A) 第一或第二象限

(B) 第二或第三象限

(C) 第一或第三象限

(D) 第二或第四象限

(2) 已知过点 A(-2, m) 和 B(m, 4) 的直线与直线  $2x+y-1=0$  平行，则 m 的值为

(A) 0

(B) -8

(C) 2

(D) 10

(3) 在  $(x-1)(x+1)^8$  的展开式中  $x^5$  的系数是

(A) -14

(B) 14

(C) -28

(D) 28

(4) 设三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  的体积为 V，P、Q 分别是侧棱  $AA_1$ 、 $CC_1$  上的点，且  $PA=QC_1$ ，则四棱锥 B-APQC 的体积为

(A)  $\frac{1}{6}V$

(B)  $\frac{1}{4}V$

(C)  $\frac{1}{3}V$

(D)  $\frac{1}{2}V$

(5)  $\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1}{3x^2 - 3x + 2} - \frac{1}{x^2 - 4x + 3} \right) =$  \_\_\_\_\_

(A)  $-\frac{1}{2}$

(B)  $\frac{1}{2}$

(C)  $-\frac{1}{6}$

(D)  $\frac{1}{6}$

(6) 若  $a = \frac{\ln 2}{2}$ ,  $b = \frac{\ln 3}{3}$ ,  $c = \frac{\ln 5}{5}$ , 则

(A)  $a < b < c$

(B)  $c < b < a$

(C)  $c < a < b$

(D)  $b < a < c$

(7) 设  $0 \leq x \leq 2\pi$ , 且  $\sqrt{1 - \sin 2x} = \sin x - \cos x$ , 则

(A)  $0 \leq x \leq \pi$

(B)  $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{7\pi}{4}$

(C)  $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{5\pi}{4}$

(D)  $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$

(8)  $\frac{2 \sin 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} \cdot \frac{\cos^2 \alpha}{\cos 2\alpha} =$

(A)  $\tan \alpha$

(B)  $\tan 2\alpha$

(C) 1

(D)  $\frac{1}{2}$

(9) 已知双曲线  $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$  的焦点为  $F_1$ 、 $F_2$ ，点  $M$  在双曲线上且  $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$ ，则点  $M$  到  $x$  轴的距离为

- (A)  $\frac{4}{3}$                       (B)  $\frac{5}{3}$                       (C)  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$                       (D)  $\sqrt{3}$

(10) 设椭圆的两个焦点分别为  $F_1$ 、 $F_2$ ，过  $F_2$  作椭圆长轴的垂线交椭圆于点  $P$ ，若  $\triangle F_1PF_2$  为等腰直角三角形，则椭圆的离心率是

- (A)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$                       (B)  $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$                       (C)  $2-\sqrt{2}$                       (D)  $\sqrt{2}-1$

(11) 不共面的四个定点到平面  $\alpha$  的距离都相等，这样的平面  $\alpha$  共有

- (A) 3 个                      (B) 4 个                      (C) 6 个                      (D) 7 个

(12) 计算机中常用十六进制是逢 16 进 1 的计数制，采用数字 0~9 和字母 A~F 共 16 个计数符号，这些符号与十进制的数的对应关系如下表：

16 进制	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
10 进制	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

例如，用十六进制表示： $E+D=1B$ ，则  $A \times B =$

- (A) 6E                      (B) 72                      (C) 5F                      (D) B0

## 第 II 卷

二. 填空题 (16 分)

(13) 已知复数  $Z_0 = 3 + 2i$ ，复数  $Z$  满足  $Z = 3Z + Z_0$ ，则复数  $Z =$  \_\_\_\_\_

(14) 已知向量  $\overrightarrow{OA} = (k, 12)$ ， $\overrightarrow{OB} = (4, 5)$ ， $\overrightarrow{OC} = (-k, 10)$ ，且 A、B、C 三点共线，则  $k =$  \_\_\_\_\_

(15) 高  $l$  为平面上过  $(0, 1)$  的直线， $l$  的斜率等可能地取  $-2\sqrt{2}, -\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{5}}{2}, 0, \frac{\sqrt{5}}{2}, \sqrt{3}, 2\sqrt{2}$ ，用  $\xi$  表示坐标原点到  $l$  的距离，由随机变量  $\xi$  的数学期望  $E\xi =$  \_\_\_\_\_

望  $E\xi =$  \_\_\_\_\_

(16) 已知在  $\triangle ABC$  中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $BC = 3$ ， $AC = 4$ ， $P$  是  $AB$  上的点，则点  $P$  到  $AC$ 、 $BC$  的距离乘积的最大值是 \_\_\_\_\_

三. 解答题：

(17) (本小题满分 12 分)


设甲、乙、丙三台机器是否需要照顾相互之间没有影响。已知在某一小时内，甲、乙都需要照顾的概率为 0.05，甲、丙都需要照顾的概率为 0.1，乙、丙都需要照顾的概率为 0.125，

(I) 求甲、乙、丙每台机器在这个小时内需要照顾的概率分别是多少；

(II) 计算这个小时内至少有一台需要照顾的概率。

(18) (本小题满分 12 分)

在四棱锥  $V-ABCD$  中，底面  $ABCD$  是正方形，侧面  $VAD$  是正三角形，平面  $VAD \perp$  底面  $ABCD$ 。



(I) 证明  $AB \perp$  平面  $VAD$ 。

(II) 求面  $VAD$  与面  $VDB$  所成的二面角的大小。

(19) 在  $\triangle ABC$  中，内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ 。

已知  $a, b, c$  成等比数列，且  $\cos B = \frac{3}{4}$ 。

① 求  $\cot A + \cot B$  的值。

② 设  $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = \frac{3}{2}$ ，求  $a + c$  的值。

(20) (本小题满分 12 分)

在等差数列  $\{a_n\}$  中，公差  $d \neq 0$ ， $a_2$  是  $a_1$  与  $a_4$  的等差中项，

已知数列  $a_1, a_3, a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_n}, \dots$  成等比数列，求数列  $\{k_n\}$  的通项  $k_n$ 。

(21) (本小题满分 14 分)

设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$  两点在抛物线  $y = 2x^2$  上， $l$  是  $AB$  的垂直平分线，

(I) 当且仅当  $x_1 + x_2$  取何值时，直线  $l$  经过抛物线的焦点  $F$ ？证明你的结论；

(II) 当  $x_1 = 1, x_2 = -3$  时，求直线  $l$  的方程。

(22) 已知函数  $f(x) = \frac{4x^2 - 7}{2 - x}, x \in [0, 1]$

① 求  $f(x)$  的单调区间和值域。

② 设  $a \geq 1$ ，函数  $g(x) = x^3 - 3ax - 2a, x \in [0, 1]$ ，若对于任意  $x_1 \in [0, 1]$ ，总存在  $x_0 \in [0, 1]$ ，

使得  $g(x_0) = f(x_1)$  成立，求  $a$  的取值范围。

参考答案

一. DBBCA, CCBCD, BA

二. 13、 $1 - \frac{3}{2}i$ ，14、 $-\frac{2}{3}$ ，15、 $\frac{4}{7}$ ，16、3

三. 解答题：

(17) 解：(I) 记甲、乙、丙三台机器在一小时需要照顾分别为事件  $A, B, C, \dots$  1 分

则 A、B、C 相互独立，

由题意得：

$$P(AB) = P(A)P(B) = 0.05$$

$$P(AC) = P(A)P(C) = 0.1$$

$$P(BC) = P(B)P(C) = 0.125 \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{解得：} P(A) = 0.2; P(B) = 0.25; P(C) = 0.5$$

所以，甲、乙、丙每台机器在这个小时内需要照顾的概率分别是 0.2、0.25、0.5……6 分

(II) ∵ A、B、C 相互独立，∴  $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$  相互独立，……7 分


∴ 甲、乙、丙每台机器在这个小时内都不需要照顾的概率为

$$P(\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}) = P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{C}) = 0.8 \times 0.75 \times 0.5 = 0.3 \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

∴ 这个小时内至少有一台需要照顾的概率为  $p = 1 - P(\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}) = 1 - 0.3 = 0.7 \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$

(18) 证明：(I) 作 AD 的中点 O，则 VO ⊥ 底面 ABCD. ……1 分

建立如图空间直角坐标系，并设正方形边长为 1，……2 分



$$\text{则 } A\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right), B\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right), C\left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right),$$

$$D\left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right), V\left(0, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

$$\therefore \overrightarrow{AB} = (0, 1, 0), \overrightarrow{AD} = (1, 0, 0), \overrightarrow{AV} = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{由 } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = (0, 1, 0) \cdot (1, 0, 0) = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AD} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AV} = (0, 1, 0) \cdot \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AV} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

又  $AB \cap AV = A$

∴  $AB \perp$  平面 VAD ……6 分

(II) 由 (I) 得  $\overrightarrow{AB} = (0, 1, 0)$  是面 VAD 的法向量……7 分

设  $\vec{n} = (1, y, z)$  是面 VDB 的法向量，则

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{VB} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BD} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1, y, z) \cdot \left(-\frac{1}{2}, 1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0 \\ (1, y, z) \cdot (-1, -1, 0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ z = -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases} \Rightarrow \vec{n} = \left(1, -1, \frac{\sqrt{3}}{3}\right) \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

$$\therefore \cos \langle \overrightarrow{AB}, \vec{n} \rangle = \frac{(0,1,0) \cdot (1,-1,\frac{\sqrt{3}}{3})}{1 \times \frac{\sqrt{21}}{3}} = -\frac{\sqrt{21}}{7}, \dots\dots\dots 11 \text{ 分}$$

又由题意知，面 VAD 与面 VDB 所成的二面角，所以其大小为  $\arccos \frac{\sqrt{21}}{7}$  .....12 分

(19) (I) 由  $\cos B = \frac{3}{4}$  得  $\sin B = \sqrt{1 - (\frac{3}{4})^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$ ,

于是  $\cot A + \cot B = \frac{1}{\tan A} + \frac{1}{\tan B}$

$$\begin{aligned} &= \frac{\cos A}{\sin A} + \frac{\cos C}{\sin C} = \frac{\sin C \cos A + \cos C \sin A}{\sin A \sin C} \\ &= \frac{\sin(A+C)}{\sin^2 B} = \frac{\sin B}{\sin^2 B} = \frac{1}{\sin B} = \frac{4}{\sqrt{7}} \end{aligned}$$

(II) 由  $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = \frac{3}{2}$  得  $ca \cdot \cos B = \frac{3}{2}$ , 由  $\cos B = \frac{3}{4}$ , 可得  $ca = 2$ , 即  $b^2 = 2$

由余弦定理  $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B$  得  $a^2 + c^2 = b^2 - 2ac \cdot \cos B = 5$

$\therefore a+c=3$

(20) 解：由题意得：  $a_2^2 = a_1 a_4$  .....1 分

即  $(a_1+d)^2 = a_1(a_1+3d)$  .....3 分

又  $d \neq 0$ ,  $\therefore a_1 = d$  .....4 分

又  $a_1, a_3, a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_n} \dots$  成等比数列,

$\therefore$  该数列的公比为  $q = \frac{a_3}{a_1} = \frac{3d}{d} = 3$ , .....6 分

所以  $a_{k_n} = a_1 \cdot 3^{n+1}$  .....8 分

又  $a_{k_n} = a_1 + (k_n - 1)d = k_n a_1$  .....10 分

$\therefore k_n = 3^{n+1}$

所以数列  $\{k_n\}$  的通项为  $k_n = 3^{n+1}$  .....12 分

(21) 解: (I)  $\because$  抛物线  $y = 2x^2$ , 即  $x^2 = \frac{y}{2}$ ,  $\therefore p = \frac{1}{4}$ ,

$\therefore$  焦点为  $F(0, \frac{1}{8})$  .....1 分

(1) 直线  $l$  的斜率不存在时, 显然有  $x_1 + x_2 = 0$  .....3 分

(2) 直线  $l$  的斜率存在时, 设为  $k$ , 截距为  $b$

即直线  $l: y = kx + b$

由已知得:

$$\begin{cases} \frac{y_1 + y_2}{2} = k \cdot \frac{x_1 + x_2}{2} + b \\ \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = -\frac{1}{k} \end{cases} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{2x_1^2 + 2x_2^2}{2} = k \cdot \frac{x_1 + x_2}{2} + b \\ \frac{2x_1^2 - 2x_2^2}{x_1 - x_2} = -\frac{1}{k} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = k \cdot \frac{x_1 + x_2}{2} + b \\ x_1 + x_2 = -\frac{1}{2k} \end{cases} \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\Rightarrow x_1^2 + x_2^2 = -\frac{1}{4} + b \geq 0$$

$$\Rightarrow b \geq \frac{1}{4}$$

即  $l$  的斜率存在时, 不可能经过焦点  $F(0, \frac{1}{8})$  .....8 分

所以当且仅当  $x_1 + x_2 = 0$  时, 直线  $l$  经过抛物线的焦点  $F$  .....9 分

(II) 当  $x_1 = 1, x_2 = -3$  时,

直线  $l$  的斜率显然存在, 设为  $l: y = kx + b$  .....10 分

则由 (I) 得:

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = k \cdot \frac{x_1 + x_2}{2} + b \\ x_1 + x_2 = -\frac{1}{2k} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} k \cdot \frac{x_1 + x_2}{2} + b = 10 \\ -\frac{1}{2k} = -2 \end{cases} \dots\dots\dots 11 \text{ 分}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} k = \frac{1}{4} \\ b = \frac{41}{4} \end{cases} \dots\dots\dots 13 \text{ 分}$$



所以直线  $l$  的方程为  $y = \frac{1}{4}x + \frac{41}{4}$ , 即  $x - 4y + 41 = 0$  .....14 分

(22)解: (I)对函数  $f(x)$  求导, 得

$$f'(x) = \frac{-4x^2 + 16x - 7}{(2-x)^2} = \frac{-(2x-1)(2x-7)}{(2-x)^2}$$

令  $f'(x) = 0$  解得  $x = \frac{1}{2}$  或  $x = \frac{7}{2}$

当  $x$  变化时,  $f'(x)$ ,  $f(x)$  的变化情况如下表:

$x$	0	$(0, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2}, 1)$	1
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$-\frac{7}{2}$		-4		-3

所以, 当  $x \in (0, \frac{1}{2})$  时,  $f(x)$  是减函数; 当  $x \in (\frac{1}{2}, 1)$  时,  $f(x)$  是增函数。

当  $x \in (0, 1)$  时,  $f(x)$  的值域为  $[-4, -3]$ 。

(II) 对函数  $g(x)$  求导, 得图表 1

$$g'(x) = 3(x^2 - a^2)$$

$\because a \geq 1$ , 当  $x \in (0, 1)$  时,  $g'(x) < 3(1 - a^2) \leq 0$

因此当  $x \in (0, 1)$  时,  $g(x)$  为减函数, 从而当  $x \in [0, 1]$  时有

$$g(x) \in [g(1), g(0)]$$

又  $g(1) = [1 - 2a - 3a^2, -2a]$ ,  $g(0) = -2a$ , 即当  $x \in [0, 1]$  时有

$$g(x) \in [1 - 2a - 3a^2, -2a]$$

任给  $x_1 \in [0, 1]$ ,  $f(x_1) \in [-4, -3]$ , 存在  $x_0 \in [0, 1]$ , 使得  $g(x_0) = f(x_1)$ , 则

$$[1 - 2a - 3a^2, -2a] \supset [-4, -3]$$

$$\text{即} \begin{cases} 1 - 2a - 3a^2 \leq -4 \\ -2a \geq -3 \end{cases} \text{解得 } a \leq \frac{3}{2}$$

又  $a \geq 1$ , 所以  $a$  的取值范围为  $1 \leq a \leq \frac{3}{2}$