

2022年上海市高考数学试卷

一、填空题（本大题共有12题，满分54分，第1~6题每题4分，第7~12题每题5分）

1. 双曲线 $\frac{x^2}{9}-y^2=1$ 的实轴长为 .

2. 函数 $f(x)=\cos^2x-\sin^2x+1$ 的周期为 .

3. 已知 $a \in R$ ，行列式 $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$ 的值与行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$ 的值相等，则 $a=$  .

4. 已知圆柱的高为4，底面积为 $9\pi$ ，则圆柱的侧面积为 .

5.  $x-y \leq 0$ ， $x+y-1 \geq 0$ ，求 $z=x+2y$ 的最小值 .

6. 二项式 $(3+x)^n$ 的展开式中， $x^2$ 项的系数是常数项的5倍，则 $n=$  .

7. 若函数 $f(x)=\begin{cases} a^2x-1 & x < 0 \\ x+a & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ 为奇函数，求参数 $a$ 的值为 .

8. 为了检测学生的身体素质指标，从游泳类1项，球类3项，田径类4项共8项项目中随机抽取4项进行检测，则每一类都被抽到的概率为 .

9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为零， $S_n$ 为其前 $n$ 项和，若 $S_5=0$ ，则 $S_i(i=0,1,2,\dots,100)$ 中不同的数值有 个.

10. 若平面向量 $\begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \\ \vec{c} \end{vmatrix} = \lambda$ ，且满足 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ， $\vec{a} \cdot \vec{c} = 2$ ， $\vec{b} \cdot \vec{c} = 1$ ，则 $\lambda=$  .


11. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=f\left(\frac{1}{1+x}\right)$ 对任意 $x \in [0, +\infty)$ 都成立，其值域是 $A_f$ ，已知对任何满足上述条件的 $f(x)$ 都有 $\{y|y=f(x), 0 \leq x \leq a\} = A_f$ ，则 $a$ 的取值范围为 .

二、选择题（本题共有4题，满分20分，每题5分）每题有且只有一个正确选项.

1. 若集合 $A=[-1,2)$ ， $B=Z$ ，则 $A \cap B=$  ( )  
A.  $\{-2, -1, 0, 1\}$  B.  $\{-1, 0, 1\}$  C.  $\{-1, 0\}$  D.  $\{-1\}$

2. 若实数 $a, b$ 满足 $a > b > 0$ ，下列不等式中恒成立的是 ( )  
A.  $a+b > 2\sqrt{ab}$  B.  $a+b < 2\sqrt{ab}$  C.  $\frac{a}{2}+2b > 2\sqrt{ab}$  D.  $\frac{a}{2}+2b < 2\sqrt{ab}$

3. 如图正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $P, Q, R, S$ 分别为棱 $AB, BC, BB_1, CD$ 的中点，联结 $A_1S, B_1D$ . 空间任意两点 $M, N$ ，若线段 $MN$ 上不存在点在线段 $A_1S, B_1D$ 上，则称 $MN$ 两点可视，则下列选项中与点 $D_1$ 可视的为 ( )



A.点P B.点B C.点R D.点Q

4. 设集合  $\Omega = \{(x,y) | (x-k)^2 + (y-k^2)^2 = 4 |k|, k \in \mathbb{Z}\}$


①存在直线  $l$ , 使得集合  $\Omega$  中不存在点在  $l$  上, 而存在点在  $l$  两侧;

②存在直线  $l$ , 使得集合  $\Omega$  中存在无数点在  $l$  上; ( )

- A.①成立②成立      B.①成立②不成立  
 C.①不成立②成立      D.①不成立②不成立

三、解答题 (本大题共有 5 题, 满分 76 分).

1. 如图所示三棱锥, 底面为等边  $\triangle ABC$ ,  $O$  为  $AC$  边中点, 且  $PO \perp$  底面  $ABC$ ,  $AP = AC = 2$ .



(1) 求三棱锥体积  $V_{P-ABC}$  ;


(2) 若  $M$  为  $BC$  中点, 求  $PM$  与面  $PAC$  所成角大小.

2.  $f(x) = \log_3(a+x) + \log_3(6-x)$ .

(1) 若将函数  $f(x)$  图像向下移  $m(m > 0)$  后, 图像经过  $(3,0)$ ,  $(5,0)$ , 求实数  $a$ ,  $m$  的值.


(2) 若  $a > -3$  且  $a \neq 0$ , 求解不等式  $f(x) \leq f(6-x)$ .

3. 如图, 在同一平面上,  $AD = BC = 6$ ,  $AB = 20$ ,  $O$  为  $AB$  中点, 曲线  $CD$  上任一点到  $O$  距离相等,  $\angle DAB = \angle ABC = 120^\circ$ ,  $P, Q$  关于  $OM$  对称,  $MO \perp AB$ ;



- (1) 若点  $P$  与点  $C$  重合, 求  $\angle POB$  的大小;
- (2)  $P$  在何位置, 求五边形  $MQABP$  面积  $S$  的最大值.

4. 设有椭圆方程  $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ , 直线  $l: x + y - 4\sqrt{2} = 0$ ,  $\Gamma$  下端点为  $A$ ,  $M$  在  $l$  上, 左、右焦点分别为  $F_1(-\sqrt{2}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{2}, 0)$ .



- (1)  $a=2$ ,  $AM$  中点在  $x$  轴上, 求点  $M$  的坐标;
- (2) 直线  $l$  与  $y$  轴交于  $B$ , 直线  $AM$  经过右焦点  $F_2$ , 在  $\triangle ABM$  中有一内角余弦值为  $\frac{3}{5}$ , 求  $b$ ;
- (3) 在椭圆  $\Gamma$  上存在一点  $P$  到  $l$  距离为  $d$ , 使  $|PF_1| + |PF_2| + d = 6$ , 随  $a$  的变化, 求  $d$  的最小值.

5. 数列  $\{a_n\}$  对任意  $n \in N^*$  且  $n \geq 2$ , 均存在正整数  $i \in [1, n-1]$ , 满  $a_{n+1} = 2a_n - a_i$ ,  $a_1 = 1$ ,  $a_2 = 3$ .

- (1) 求  $a_4$  可能值;
- (2) 命题  $p$ : 若  $a_1, a_2, \dots, a_8$  成等差数列, 则  $a_9 < 30$ , 证明  $p$  为真, 同时写出  $p$  逆命题  $q$ , 并判断命题  $q$  是真还是假, 说明理由;
- (3) 若  $a_{2m} = 3^m$ , ( $m \in N^*$ ) 成立, 求数列  $\{a_n\}$  的通项公式.

