

一. 选择题：本大题共10小题，每小题5分，共50分.

在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

(1) i 是虚数单位，复数 $\frac{7+i}{3+4i} = ()$

- A. $1-i$ B. $-1+i$ C. $\frac{17}{25} + \frac{31}{25}i$ D. $-\frac{17}{7} + \frac{25}{7}i$

(2) 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y-2 \geq 0, \\ x-y-2 \leq 0, \\ y \geq 1. \end{cases}$ 则目标函数 $z = x+2y$ 的最小值为 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

3. 已知命题 $p: \forall x > 0$, 总有 $(x+1)e^x > 1$, 则 $\neg p$ 为 ()

A. $\exists x_0 \leq 0$, 使得 $(x_0+1)e^{x_0} \leq 1$ B. $\exists x_0 > 0$, 使得 $(x_0+1)e^{x_0} \leq 1$

C. $\exists x_0 > 0$, 总有 $(x_0+1)e^{x_0} \leq 1$ D. $\exists x_0 \leq 0$, 总有 $(x_0+1)e^{x_0} \leq 1$

4. 设 $a = \log_2 \pi, b = \log_{\frac{1}{2}} \pi, c = \pi^{-2}$, 则 ()

- A. $a > b > c$ B. $b > a > c$ C. $a > c > b$ D. $c > b > a$

5. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1 , 公差为 -1 的等差数列, S_n 为其前 n 项和, 若 S_1, S_2, S_4 成等比数列, 则 $a_1 = ()$

- A. 2 B. -2 C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一条渐近线平行于直线 $l: y = 2x + 10$, 双曲线的一个焦点在直线 l 上, 则双曲线的方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{20} = 1$ B. $\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{5} = 1$ C. $\frac{3x^2}{25} - \frac{3y^2}{100} = 1$ D. $\frac{3x^2}{100} - \frac{3y^2}{25} = 1$

7. 如图, $\triangle ABC$ 是圆的内接三角形, $\angle BAC$ 的平分线交圆于点 D , 交 BC 于 E , 过点 B 的圆的切线与 AD 的延长线交于点 F , 在上述条件下, 给出下列四个结论: ① BD 平分 $\angle CBF$; ②

$FB^2 = FD \cdot FA$; ③ $AE \cdot CE = BE \cdot DE$; ④ $AF \cdot BD = AB \cdot BF$. 则所有正确结论的序号

是 ()

- A. ①② B. ③④ C. ①②③ D. ①②④

8. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin \omega x + \cos \omega x (\omega > 0), x \in R$. 在曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 1$ 的交点


中, 若相邻交点距离的最小值为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $f(x)$ 的最小正周期为 ()

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{2\pi}{3}$ C. π D. 2π


二. 填空题: 本大题共6小题, 每小题5分, 共30分.

9. 某大学为了解在校本科生对参加某项社会实践活动的意向, 拟采用分层抽样的方法, 从该校四个年级的本科生中抽取一个容量为300的样本进行调查. 已知该校一年级、二年级、三年级、四年级的本科生人数之比为4:5:5:6, 则应从一年级本科生中抽取__名学生.

10. 一个几何体的三视图如图所示 (单位: m), 则该几何体的体积为__ m^3 .



11. 阅读右边的框图, 运行相应的程序, 输出 S 的值为_____.



12. 函数 $f(x) = \lg x^3$ 的单调递减区间是_____.

13. 已知菱形 $ABCD$ 的边长为2, $\angle BAD = 120^\circ$, 点 E, F 分别在边 BC, DC 上, $BC = 3BE, DC = \lambda DF$. 若 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = 1$, 则 λ 的值为_____.

(14) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |x^2 + 5x + 4|, & x \leq 0 \\ 2|x - 2|, & x > 0 \end{cases}$ 若函数 $y = f(x) - a|x|$ 恰有4个零点, 则实数 a

的取值范围为_____

三. 解答题: 本大题共6小题, 共80分, 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤

(15) (本小题满分13分)

某校夏令营有3名男同学 A, B, C 和3名女同学 X, Y, Z ，其年级情况如下表：

	一年级	二年级	三年级
男同学	A	B	C
女同学	X	Y	Z

现从这6名同学中随机选出2人参加知识竞赛（每人被选到的可能性相同）

(1) 用表中字母列举出所有可能的结果

(2) 设 M 为事件“选出的2人来自不同年级且恰有1名男同学和1名女同学”，求事件 M 发生的概率.

(16) (本小题满分13分)

在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，已知 $a - c = \frac{\sqrt{6}}{6}b$,

$$\sin B = \sqrt{6} \sin C$$

(1) 求 $\cos A$ 的值；

(2) 求 $\cos(2A - \frac{\pi}{6})$ 的值.

17、(本小题满分13分)


如图，四棱锥 $P - ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是平行四边形， $BA = BD = \sqrt{2}$ ， $AD = 2$ ， $PA = PD = \sqrt{5}$ ， E, F 分别是棱 AD ， PC 的中点.

(1) 证明： $EF \parallel$ 平面 PAB ；

(2) 若二面角 $P-AD-B$ 为 60° ，

① 证明：平面 $PBC \perp$ 平面 $ABCD$

② 求直线 EF 与平面 PBC 所成角的正弦值.



18、(本小题满分13分)

设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，右顶点为 A ，上顶点为 B . 已

知 $|AB| = \frac{\sqrt{3}}{2} |F_1F_2|$.

- (1) 求椭圆的离心率;
- (2) 设P为椭圆上异于其顶点的一点, 以线段PB为直径的圆经过点 F_1 , 经过点 F_2 的直线与该圆相切与点M, $|MF_2| = 2\sqrt{2}$. 求椭圆的方程.

19 (本小题满分14分)

已知函数 $f(x) = x^2 - \frac{2}{3}ax^3 (a > 0), x \in R$

- (1) 求 $f(x)$ 的单调区间和极值;
- (2) 若对于任意的 $x_1 \in (2, +\infty)$, 都存在 $x_2 \in (1, +\infty)$, 使得 $f(x_1) \cdot f(x_2) = 1$, 求 a 的取值范围

20 (本小题满分14分)

已知 q 和 n 均为给定的大于1的自然数, 设集合 $M = \{0, 1, 2, \dots, q-1\}$, 集合

$$A = \{x \mid x = x_1 + x_2q + \dots + x_nq^{n-1}, x_i \in M, i = 1, 2, \dots, n\},$$

- (1) 当 $q = 2, n = 3$ 时, 用列举法表示集合A;

设 $s, t \in A, s = a_1 + a_2q + \dots + a_nq^{n-1}, t = b_1 + b_2q + \dots + b_nq^{n-1}$, 其中 $a_i, b_i \in M, i = 1, 2, \dots, n$,

证明: 若 $a_n < b_n$, 则 $s < t$.

2014年天津高考文科数学试题逐题详解（纯word解析版）

一、选择题:在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

【2014年天津卷(文01)】 i 是虚数单位,复数 $\frac{7+i}{3+4i} =$

- A. $1-i$ B. $-1+i$ C. $\frac{17}{25} + \frac{31}{25}i$ D. $-\frac{17}{7} + \frac{25}{7}i$

【答案】A

【解析】 $\frac{7+i}{3+4i} = \frac{(7+i)(3-4i)}{(3+4i)(3-4i)} = \frac{25-25i}{25} = 1-i$


【2014年天津卷(文02)】设变量 x 、 y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y-2 \geq 0 \\ x-y-2 \leq 0 \\ y \geq 1 \end{cases}$,则目标函数

$z = x + 2y$ 的最小值为

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】B

【解析】画出可行域,如图所示.解方程组 $\begin{cases} x+y-2=0 \\ y=1 \end{cases}$,得 $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$,即点 $A(1, 1)$.



当目标函数线过可行域内 A 点时,目标函数有最小值,即 $z_{\min} = 1 \times 1 + 2 \times 1 = 3$.

【2014年天津卷(文03)】已知命题 $p: \forall x > 0$, 总有 $(x+1)e^x > 1$,则 $\neg p$ 为()

- A. $\exists x_0 \leq 0$, 使得 $(x_0+1)e^{x_0} \leq 1$ B. $\exists x_0 > 0$, 使得 $(x_0+1)e^{x_0} \leq 1$
C. $\forall x > 0$, 总有 $(x+1)e^x \leq 1$ D. $\forall x \leq 0$, 总有 $(x+1)e^x \leq 1$

【答案】B

【解析】根据全称命题的否定为特称命题可知, $\neg p$ 为 $\exists x_0 > 0$, 使得 $(x_0+1)e^{x_0} \leq 1$,

【2014年天津卷(文04)】设 $a = \log_2 \pi$, $b = \log \frac{1}{2} \pi$, $c = \pi^{-2}$, 则()

- A. $a > b > c$ B. $b > a > c$ C. $a > c > b$ D. $c > b > a$

【答案】C

【解析】 $\log_2 \pi > 1$, $\log_{\frac{1}{2}} \pi < 0$, $0 < \pi^{-2} < 1$, 即 $a > 1$, $b < 0$, $0 < c < 1$, $\therefore a > c > b$

【2014年天津卷（文05）】设 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 -1 的等差数列, S_n 为其前 n 项和, 若 S_1, S_2, S_4 成等比数列, 则 $a_1 =$ ()

- A. 2 B. -2 C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

【答案】D

【解析】 $\because \{a_n\}$ 是首项为 a_1 , 公差为 -1 的等差数列, S_n 为其前 n 项和, $\therefore S_1 = a_1$, $S_2 = 2a_1 - 1$, $S_4 = 4a_1 - 6$,

由 S_1, S_2, S_4 成等比数列, 得: $S_2^2 = S_1 \cdot S_4$, 即

$$(2a_1 - 1)^2 = a_1(4a_1 - 6), \text{ 解得: } a_1 = -\frac{1}{2}$$

【2014年天津卷（文06）】已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线平行于直线

1: $y = 2x + 10$, 双曲线的一个焦点在直线1上, 则双曲线的方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{20} = 1$ B. $\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{5} = 1$
C. $\frac{3x^2}{25} - \frac{3y^2}{100} = 1$ D. $\frac{3x^2}{100} - \frac{3y^2}{25} = 1$

【答案】A

【解析】令 $y = 0$, 可得 $x = -5$, 即焦点坐标为 $(-5, 0)$, $\therefore c = 5$,


\because 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线平行于直线1: $y = 2x + 10$,

$$\therefore \frac{b}{a} = 2, \because c^2 = a^2 + b^2, \therefore a^2 = 5, b^2 = 20, \therefore \text{双曲线的方程为 } \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{20} = 1$$

【2014年天津卷（文07）】如图, $\triangle ABC$ 是圆的内接三角形, $\angle BAC$ 的平分线交圆于点 D , 交 BC 于 E , 过点 B 的圆的切线与 AD 的延长线交于点 F , 在上述条件下, 给出下列四个结论:

①BD平分 $\angle CBF$ ；② $FB^2=FD\cdot FA$ ；③ $AE\cdot CE=BE\cdot DE$ ；④ $AF\cdot BD=AB\cdot BF$.

所有正确结论的序号是（ ）



- A. ①② B. ③④ C. ①②③ D. ①②④

【答案】D

【解析】 \because 圆周角 $\angle DBC$ 对应劣弧 CD ，圆周角 $\angle DAC$ 对应劣弧 CD ， $\therefore \angle DBC = \angle DAC$.

\because 弦切角 $\angle FBD$ 对应劣弧 BD ，圆周角 $\angle BAD$ 对应劣弧 BD ， $\therefore \angle FBD = \angle BAF$.

\because BD是 $\angle BAC$ 的平分线， $\therefore \angle BAF = \angle DAC$ 。 $\therefore \angle DBC = \angle FBD$. 即BD平分 $\angle CBF$. 即结论①正确.

又由 $\angle FBD = \angle FAB$ ， $\angle BFD = \angle AFB$ ，得 $\triangle FBD \sim \triangle FAB$.

由 $\frac{FB}{FA} = \frac{FD}{FB}$ ， $FB^2 = FD \cdot FA$. 即结论②成立. 由 $\frac{BF}{AF} = \frac{BD}{AB}$ ，得 $AF \cdot BD = AB \cdot BF$. 即结论④成立.

立

【2014年天津卷（文08）】已知函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin \omega x + \cos \omega x$ ($\omega > 0$)， $x \in \mathbb{R}$ ，在曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 1$ 的交点中，若相邻交点距离的最小值为 $\frac{\pi}{3}$ ，则 $f(x)$ 的最小正周期为（ ）

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{2\pi}{3}$ C. π D. 2π

【答案】C

【解析】 \because 已知函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin \omega x + \cos \omega x = 2\sin(\omega x + \frac{\pi}{6})$ ($\omega > 0$)， $x \in \mathbb{R}$,

在曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 1$ 的交点中，若相邻交点距离的最小值为 $\frac{\pi}{3}$ ，正好等于 f

(x)的周期的 $\frac{1}{3}$ 倍，

设函数 $f(x)$ 的最小正周期为 T ，则 $\frac{1}{3} \cdot T = \frac{\pi}{3}$ ， $\therefore T = \pi$

二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分.


【2014年天津卷（文09）】某大学为了解在校本科生对参加某项社会实践活动的意向，拟采用分层抽样的方法，从该校四个年级的本科生中抽取一个容量为300的样本进行调查. 已

知该校一年级、二年级、三年级、四年级的本科生人数之比为4:5:5:6，则应从一年级本科生中抽取____名学生.

【答案】60

【解析】由分层抽样的方法可得，从一年级本科生中抽取学生人数为 $300 \times \frac{4}{4+5+5+6} = 60$

【2014年天津卷（文10）】一个几何体的三视图如图所示（单位： m ），则该几何体的体积为_____ m^3 .




【答案】 $\frac{20\pi}{3}$

【解析】

由三视图可得，该几何体为圆柱与圆锥的组合物，其体积 $V = \pi \times 1^2 \times 4 + \frac{1}{3} \pi \times 2^2 \times 2 = \frac{20\pi}{3}$

【2014年天津卷（文11）】阅读如图的框图，运行相应的程序，输出S的值为_____.



【答案】-4

【解析】依题由框图知，第一次循环得到：S = -8，n = 2；第二次循环得到：S = -4，n = 1；退出循环，输出 -4

【2014年天津卷（文12）】函数 $f(x) = \lg x^2$ 的单调递减区间是_____。

【答案】 $(-\infty, 0)$

【解析】方法一： $y = \lg x^2 = 2\lg|x|$ ， \therefore 当 $x > 0$ 时， $f(x) = 2\lg x$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数；
当 $x < 0$ 时， $f(x) = 2\lg(-x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上是减函数。
 \therefore 函数 $f(x) = \lg x^2$ 的单调递减区间是 $(-\infty, 0)$ 。

方法二：原函数是由 $\begin{cases} t = x^2 \\ y = \lg t \end{cases}$ 复合而成， $\therefore t = x^2$ 在 $(-\infty, 0)$ 上是减函数，在 $(0, +\infty)$ 为增函数；

又 $y = \lg t$ 在其定义域上为增函数， $\therefore f(x) = \lg x^2$ 在 $(-\infty, 0)$ 上是减函数，在 $(0, +\infty)$ 为增函数， \therefore 函数 $f(x) = \lg x^2$ 的单调递减区间是 $(-\infty, 0)$

【2014年天津卷（文13）】已知菱形ABCD的边长为2， $\angle BAD = 120^\circ$ ，点E，F分别在边BC，D C上， $BC = 3BE$ ， $DC = \lambda DF$ 、若 $\vec{AE} \cdot \vec{AF} = 1$ ，则 λ 的值为_____。

【答案】2

【解析】 $\because BC = 3BE$ ， $DC = \lambda DF$ ， $\therefore \vec{BE} = \frac{1}{3}\vec{BC}$ ， $\vec{DF} = \frac{1}{\lambda}\vec{DC}$ ，

$$\vec{AE} = \vec{AB} + \vec{BE} = \vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{BC} = \vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AD}, \quad \vec{AF} = \vec{AD} + \vec{DF} = \vec{AD} + \frac{1}{\lambda}\vec{DC} = \vec{AD} + \frac{1}{\lambda}\vec{AB},$$

∵菱形ABCD的边长为2, $\angle BAD=120^\circ$, $\therefore |\vec{AB}|=|\vec{AD}|=2$, $\vec{AB}\cdot\vec{AD}=2\times 2\times \cos 120^\circ = -2$,


$\therefore \vec{AE}\cdot\vec{AF}=1$, $\therefore (\vec{AB}+\frac{1}{3}\vec{AD})\cdot(\vec{AD}+\frac{1}{\lambda}\vec{AB})=\frac{1}{3}\vec{AD}^2+\frac{1}{\lambda}\vec{AB}^2+(1+\frac{1}{3\lambda})\vec{AB}\cdot\vec{AD}=1$,

即 $\frac{1}{3}\times 4+\frac{1}{\lambda}\times 4-2(1+\frac{1}{3\lambda})=1$, 整理得 $\frac{10}{3\lambda}=\frac{5}{3}$, 解得 $\lambda=2$

【2014年天津卷(文14)】已知函数 $f(x)=\begin{cases} |x^2+5x+4|, & x\leq 0 \\ 2|x-2|, & x>0 \end{cases}$, 若函数 $y=f(x)-a|x|$ 恰有4个零点, 则实数a的取值范围为_____.

【答案】(1, 2)

【解析】由 $y=f(x)-a|x|=0$ 得 $f(x)=a|x|$, 作出函数 $y=f(x)$, $y=a|x|$ 的图象, 当 $a\leq 0$, 不满足条件, $\therefore a>0$, 当 $a=2$ 时, 此时 $y=a|x|$ 与 $f(x)$ 有三个交点, 当 $a=1$ 时, 此时 $y=a|x|$ 与 $f(x)$ 有五个交点, \therefore 要使函数 $y=f(x)-a|x|$ 恰有4个零点, 则 $1<a<2$



三、解答题: 本大题共6小题, 共80分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

【2014年天津卷(文15)】(本小题满分13分)

某校夏令营有3名男同学, A、B、C和3名女同学X、Y、Z, 其年级情况如表:

	一年级	二年级	三年级
男同学	A	B	C
女同学	X	Y	Z

现从这6名同学中随机选出2人参加知识竞赛(每人被选到的可能性相同)

(I) 用表中字母列举出所有可能的结果;

(II) 设M为事件“选出的2人来自不同年级且恰有1名男同学和1名女同学”, 求事件M发生的概率.

解：（I）用表中字母列举出所有可能的结果有：（A，B）、（A，C）、（A，X）、（A，Y）、（A，Z）、

（B，C）、（B，X）、（B，Y）、（B，Z）、（C，X）、（C，Y）、（C，Z）、（X，Y）、（X，Z）、（Y，Z）

共计15个结果。

（II）设M为事件“选出的2人来自不同年级且恰有1名男同学和1名女同学”，

则事件M包含的结果有：（A，Y）、（A，Z）、（B，X）、（B，Z）、（C，X）、（C，Y），共计6个结果，

故事件M发生的概率为 $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$

【2014年天津卷（文16）】（本小题满分13分）

在 $\triangle ABC$ 中，内角A，B，C所对的边分别为a，b，c，已知 $a - c = \frac{\sqrt{6}}{6}b$ ， $\sin B = \sqrt{6}\sin C$ ，

（I）求 $\cos A$ 的值；

（II）求 $\cos(2A - \frac{\pi}{6})$ 的值。

解：（I）将 $\sin B = \sqrt{6}\sin C$ ，利用正弦定理化简得： $b = \sqrt{6}c$ ，代入 $a - c = \frac{\sqrt{6}}{6}b$ ，得： $a - c = c$ ，即 $a = 2c$ ，

$$\therefore \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{6c^2 + c^2 - 4c^2}{2\sqrt{6}c^2} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

（II） $\because \cos A = \frac{\sqrt{6}}{4}$ ，A为三角形内角， $\therefore \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{\sqrt{10}}{4}$ ，

$$\therefore \cos 2A = 2\cos^2 A - 1 = -\frac{1}{4}, \quad \sin 2A = 2\sin A \cos A = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

$$\text{则 } \cos(2A - \frac{\pi}{6}) = \cos 2A \cos \frac{\pi}{6} + \sin 2A \sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{4} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{15}}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{15} - \sqrt{3}}{8}$$

【2014年天津卷（文17）】（本小题满分13分）


如图，四棱锥P - ABCD的底面ABCD是平行四边形， $BA = BD = \sqrt{2}$ ， $AD = 2$ ， $PA = PD = \sqrt{5}$ ，E，F分别是棱AD，PC的中点。

（I）证明EF // 平面PAB；

（II）若二面角P - AD - B为 60° ，

（i）证明平面PBC \perp 平面ABCD；

（ii）求直线EF与平面PBC所成角的正弦值。



解：（I）证明：连结AC， $AC \cap BD = H$ ， \because 底面ABCD是平行四边形， $\therefore H$ 为BD中点，

$\because E$ 是棱AD的中点， \therefore 在 $\triangle ABD$ 中， $EH \parallel AB$ ，

又 $\because AB \subset$ 平面PAB， $EH \not\subset$ 平面PAB， $\therefore EH \parallel$ 平面PAB. 同理可证， $FH \parallel$ 平面PAB.

又 $\because EH \cap FH = H$ ， \therefore 平面EFH \parallel 平面PAB， $\because EF \subset$ 平面EFH， $\therefore EF \parallel$ 平面PAB；

（II）（i）如图，连结PE，BE. $\because BA = BD = \sqrt{2}$ ， $AD = 2$ ， $PA = PD = \sqrt{5}$ ， $\therefore BE = 1$ ， $PE = 2$.

又 $\because E$ 为AD的中点， $\therefore BE \perp AD$ ， $PE \perp AD$ ，

$\therefore \angle PEB$ 即为二面角P - AD - B的平面角，即 $\angle PEB = 60^\circ$ ， $\therefore PB = \sqrt{3}$.

$\because \triangle PBD$ 中， $BD^2 + PB^2 = PD^2$ ， $\therefore PB \perp BD$ ，同理 $PB \perp BA$ ， $\therefore PB \perp$ 平面ABD，

$\because PB \subset$ 平面PBC， \therefore 平面PAB \perp 平面ABCD；

（ii）由（i）知， $PB \perp BD$ ， $PB \perp BA$ ， $\because BA = BD = \sqrt{2}$ ， $AD = 2$ ， $\therefore BD \perp BA$ ，

$\therefore BD$ ， BA ， BP 两两垂直，

以B为坐标原点，分别以BD，BA，BP为X，Y，Z轴，建立如图所示的空间直角坐标系B - DAP，

则有A (0, $\sqrt{2}$, 0)，B (0, 0, 0)，C ($\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$, 0)，D ($\sqrt{2}$, 0, 0)，P (0, 0, $\sqrt{3}$)，

$\therefore \overrightarrow{BC} = (\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0)$ ， $\overrightarrow{BP} = (0, 0, \sqrt{3})$ ，


设平面PBC的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ ， $\therefore \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BP} = 0 \end{cases}$ ， $\therefore \begin{cases} \sqrt{2}x - \sqrt{2}y = 0 \\ \sqrt{3}z = 0 \end{cases}$ ，令 $x = 1$

，则 $y = 1$ ， $z = 0$ ，

故 $\vec{n} = (1, 1, 0)$, $\because E, F$ 分别是棱 AD, PC 的中点, $\therefore E(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0), F(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$,

$$\therefore \vec{EF} = (0, -\sqrt{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}), \therefore \cos \langle \vec{n}, \vec{EF} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{EF}}{|\vec{n}| |\vec{EF}|} = \frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{11}}{2}} = -\frac{2\sqrt{11}}{11}$$

即直线 EF 与平面 PBC 所成角的正弦值为 $\frac{2\sqrt{11}}{11}$



【2014年天津卷（文18）】（本小题满分13分）

设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 右顶点为 A , 上顶点为 B , 已知 $|AB| = \frac{\sqrt{3}}{2} |F_1 F_2|$.

$$|AB| = \frac{\sqrt{3}}{2} |F_1 F_2|$$

(I) 求椭圆的离心率;

(II) 设 P 为椭圆上异于其顶点的一点, 以线段 PB 为直径的圆经过点 F_1 , 经过点 F_2 的直线 l 与该圆相切于点 M , $|MF_2| = 2\sqrt{2}$, 求椭圆的方程.

解: (I) 依题意可知 $\sqrt{a^2 + b^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2c$, $\because b^2 = a^2 - c^2$, $\therefore a^2 + b^2 = 2a^2 - c^2 = 3c^2$, $\therefore a^2 = 2c^2$, \therefore

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(II) 由 (I) 知 $a^2 = 2c^2$, $\therefore b^2 = a^2 - c^2 = c^2$, \therefore 椭圆方程为 $\frac{x^2}{2c^2} + \frac{y^2}{c^2} = 1$, $B(0, c), F_1(-c, 0)$,

设 P 点坐标 $(\sqrt{2}c \sin \theta, c \cos \theta)$, 圆心为 O , $\because PB$ 为直径, $\therefore BF_1 \perp PF_1$,

$$\therefore k_{BF_1} \cdot k_{PF_1} = \frac{c}{c} \cdot \frac{c \cos \theta}{\sqrt{2c \sin \theta + c}} = -1, \text{ 求得 } \sin \theta = -\frac{2\sqrt{2}}{3} \text{ 或 } 0 \text{ (舍去),}$$

由椭圆对称性可知, P在x轴下方和上方结果相同, 只看在x轴上方时,

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \frac{8}{9}} = \frac{1}{3}, \therefore P \text{ 坐标为 } \left(-\frac{4}{3}c, \frac{1}{3}c\right), \therefore \text{ 圆心坐标为 } \left(-\frac{2}{3}c, \frac{2}{3}c\right),$$

$$\therefore r = |OB| = \sqrt{\frac{4}{9}c^2 + \frac{c^2}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}c, \quad |OF_2| = \sqrt{\frac{25c^2}{9} + \frac{4c^2}{9}} = \frac{\sqrt{29}}{3}c,$$

$$\therefore r^2 + |MF_2|^2 = |OF_2|^2, \therefore \frac{5c^2}{9} + 8 = \frac{29}{9}c^2, \therefore c^2 = 3, \therefore a^2 = 6, b^2 = 3, \therefore \text{ 椭圆的方程为 } \frac{x^2}{6}$$

$$+ \frac{y^2}{3} = 1$$

【2014年天津卷(文19)】(本小题满分14分)

已知函数 $f(x) = x^2 - \frac{2}{3}ax^3$ ($a > 0$), $x \in \mathbb{R}$.

(I) 求 $f(x)$ 的单调区间和极值;

(II) 若对于任意的 $x_1 \in (2, +\infty)$, 都存在 $x_2 \in (1, +\infty)$, 使得 $f(x_1) \cdot f(x_2) = 1$, 求 a 的取值范围.

解: (I) $f'(x) = 2x - 2ax^2 = 2x(1 - ax)$,

$\therefore a > 0$, \therefore 当 $x < 0$ 或 $x > \frac{1}{a}$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时, $f'(x) > 0$,

$f(x)$ 单调递减区间为: $(-\infty, 0)$ 和 $(\frac{1}{a}, +\infty)$, 单调递增区间为

$(0, \frac{1}{a})$,

当 $x=0$ 时, 有极小值 $f(0) = 0$, 当 $x = \frac{1}{a}$ 时, 有极大值 $f(\frac{1}{a}) = \frac{1}{3a^2}$;

(II) 由 $f(0) = f(\frac{3}{2a}) = 0$ 及 (I) 知, 当 $x \in (0, \frac{3}{2a})$ 时, $f(x) > 0$; 当 $x \in (\frac{3}{2a}, +\infty)$ 时, $f(x) < 0$.

设集合 $A = \{f(x) \mid x \in (2, +\infty)\}$, 集合 $B = \{\frac{1}{f(x)} \mid x \in (1, +\infty), f(x) \neq 0\}$,

则对于任意的 $x_1 \in (2, +$

$\infty)$, 都存在 $x_2 \in (1, +\infty)$, 使得 $f(x_1) \cdot f(x_2) = 1$, 等价于 $A \subseteq B$, 显然 $A \neq \emptyset$

下面分三种情况讨论:

(1) 当 $\frac{3}{2a} > 2$, 即 $0 < a < \frac{3}{4}$ 时, 由 $f(\frac{3}{2a}) = 0$ 可知, $0 \in A$, 而 $0 \notin B$, $\therefore A$ 不是 B 的子集;

(2) 当 $1 \leq \frac{3}{2a} \leq 2$, 即 $\frac{3}{4} \leq a \leq \frac{3}{2}$ 时, $f(2) \leq 0$, 且 $f(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 上单调递减, 故 $A = (-\infty, f(2))$, $\therefore A \subseteq (-\infty, 0)$; 由 $f(1) \geq 0$, 有 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上的取值范围包含 $(-\infty, 0)$, 即 $(-\infty, 0) \subseteq B$, $\therefore A \subseteq B$;

(3) 当 $\frac{3}{2a} < 1$, 即 $a > \frac{3}{2}$ 时, 有 $f(1) < 0$, 且 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 故 $B = (\frac{1}{f(1)}, 0)$, $A = (-\infty, f(2))$, $\therefore A$ 不是 B 的子集. 综上, a 的取值范围是 $[\frac{3}{4}, \frac{3}{2}]$

【2014年天津卷(文20)】(本小题满分14分)

已知 q 和 n 均为给定的大于1的自然数, 设集合 $M = \{0, 1, 2, \dots, q-1\}$, 集合 $A = \{x \mid x = x_1 + x_2q + \dots + x_nq^{n-1}, x_i \in M, i = 1, 2, \dots, n\}$.

(I) 当 $q=2, n=3$ 时, 用列举法表示集合 A ;

(II) 设 $s, t \in A$, $s = a_1 + a_2q + \dots + a_nq^{n-1}$, $t = b_1 + b_2q + \dots + b_nq^{n-1}$, 其中 $a_i, b_i \in M, i = 1, 2, \dots, n$. 证明: 若 $a_n < b_n$, 则 $s < t$.

(I) 解: 当 $q=2, n=3$ 时, $M = \{0, 1\}$, $A = \{x \mid x = x_1 + x_2 \cdot 2 + x_3 \cdot 2^2, x_i \in M, i = 1, 2, 3\}$

可得 $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

(II) 证明: 由设 $s, t \in A$, $s = a_1 + a_2q + \dots + a_nq^{n-1}$, $t = b_1 + b_2q + \dots + b_nq^{n-1}$, 其中 $a_i, b_i \in M, i = 1, 2, \dots, n$. $a_n < b_n$,

$$\begin{aligned} \therefore a_n - b_n &\leq -1. \text{ 可得 } s - t = (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2)q + \dots + (a_{n-1} - b_{n-1})q^{n-2} \\ &+ (a_n - b_n)q^{n-1} \end{aligned}$$

$$\leq - [1+q+\dots+q^{n-2}+q^{n-1}]$$

$$= - \frac{q^n - 1}{q - 1} < 0.$$

$$\therefore s < t$$