

## 绝密★启用前

### 2013年普通高等学校招生全国统一考试（湖南卷）

#### 数学理工农医类（精编版）

【试卷总评】本试卷共有 24 个问题，其中 1—12 题为选择题，13—16 为填空题，17—21 为必做解答题，22—24 为选做解答题，满分 150 分，具体考点如下：

#### 一、选择题考点一览表：

题号	主要考点
1	复数的基本运算、复数的几何意义
2	简单堆积抽样的定义
3	正弦定理
4	线性规划
5	基本初等函数图像
6	平面向量的基本运算
7	三视图
8	对称问题

这 8 道选择题中，第 1-3 为基础题，注重基础知识的考查、基本公式的应用，第 4-7 为数形结合的问题，基本图像的观察以及基本思想的渗透，其中 4、5 两题注重培养学生的动手能力，要求学生自己做出图像，自己分析得到答案，第 7 题注重空间想象能力的培养，要求学生寻找正方体在旋转过程中的最值，第 8 题，与平面几何知识想结合，要求将平面几何问题解析话，降低解题的难度；总体老说，这 9 道问题难度相对均衡，无偏题、怪题；

#### 二、填空题考点一览表：

题号	主要考点
9	参数方程
10	不等式选讲
11	几何证明
12	定积分的基本运算

13	算法以及程序框图
14	双曲线的定义及性质
15	新定义数列
16	函数与三角形

8道填空题中，9-11题为选修内容，要求三题中必做两题，相对难度较低；12-14注重基本公式的考查以及逻辑分析能力的培养，要求学生必须细心踏实的学好这部分内容，15题注重源于平常练习中的习题，但是难度略高于练习，要求学生有一定的创新能力；16题为函数与三角形结合的问题，要求学生具有处理综合问题的能力以及较好的逻辑推理能力；

### 三、解答题考点说明表：

题号	主要考点
17	三角函数的计算、三角恒等变换
18	概率的基本计算、排列组合知识、离散型随机变量分布列、期望
19	线面垂直的判定以及性质、线面成角
20	应用题
21	抛物线的定义、直线与圆锥曲线关系
22	导数与函数

第17题：本题为三角函数，第（1）问，考查简单的三角函数的计算；第（2）问考查三角恒等变换知识，包括降幂升角，以及解不等式，考查学生的基本功是否扎实；本题难度不大；

第18题：本题为概率统计问题，第（1）小题考查学生的观察能力与数据处理能力，需要学生在读懂问题、读懂图形的基础上加以处理数据，进而使用简单的排列组合进行计算；第（2）小题考查离散型随机变量的分布列，这是每年的必考题，亦为重难点；本题难度不大；

第19题：本题为立体几何问题第（1）问考查线线垂直，学生必须对线线垂直进行转化，通过线面垂直来证明线线垂直，进而找到解题思路；第（2）考查线面成角，考虑使用向量法降低立体思维的难度，将立体几何问题计算化，便于在考场节省时间；

第20题：本题为应用题，试题较为注重数学建模能力的考查，试题以绝对值不等式为主干进行构造，要求学生从实际问题中提取信息，进而抽象出函数模型进行求解；

第21题：本题为圆锥曲线问题，试题以此开始，难度和计算量有了较大的提升，第（1）小题以向

量为背景，要求学生练习直线与圆锥曲线的方程进行解题，在解题的过程中充分利用根与系数的关系进行求解，本小题侧重计算能力的考查；第（2）小题加入了数形结合能力的培养，要求学生实现想象一作图一计算一体化，对于综合知识能力不好的学生，往往得分率不高；

第 21 题，本题为函数与方程问题，作为本卷的压轴题，有着一定的特点；试题选取了绝对值不等式为背景，第（1）小题就要求学生有着一定的分类讨论能力，才能实现最值的探索；第（2）小题，综合性较强，且在解题的过程中需要将条件不断的转化、调整，试题难度较大，具有很好的区分度；

综上：本套试题作为高考的选拔性考试非常有优势，就是题题的设问方式都规避了模式化的单刀直入法，可谓题题都有新鲜感，不过不足之处也恰恰在于此，对于那些理解能力、化归转化能力、阅读能力偏弱的同学来说就是一大灾难。

**本解析为学科网名师解析团队原创，授权学科网独家使用，如有盗用，依法追责！**

本试卷包括选择题、填空题和解答题三部分，共 5 页，时量 120 分钟，满分 150 分。

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 复数  $z = i \cdot (1+i)$  ( $i$  为虚数单位) 在复平面上对应的点位于 ( )

- A. 第一象限    B. 第二象限    C. 第三象限    D. 第四象限

**【答案】B;**

**【解析】**  $z = i(1+i) = i + i^2 = -1 + i$ ，故对应的点在第二象限.

**【学科网考点定位】** 本题考查复数的四则运算以及复数的几何意义，考查学生的基本运算能力.

2. 某学校有男、女学生各 500 名. 为了解男女学生在学习兴趣与业余爱好方面是否存在显著差异，拟从全体学生中抽取 100 名学生进行调查，则宜采用的抽样方法是 ( )

- A. 抽签法    B. 随机数法    C. 系统抽样法    D. 分层抽样法

**【答案】D;**

**【解析】** 为了解男女学生在学习兴趣与业余爱好方面是否存在显著差异，男生与女生之间存在差异，故使用分层抽样；

**【学科网考点定位】** 本题考查随机抽样的定义，考查学生对定义的理解.

3. 在锐角中  $\triangle ABC$ ，角  $A, B$  所对的边长分别为  $a, b$ . 若  $2a \sin B = \sqrt{3}b$ ，则角  $A$  等于 ( )

- A.  $\frac{\pi}{12}$     B.  $\frac{\pi}{6}$     C.  $\frac{\pi}{4}$     D.  $\frac{\pi}{3}$


【答案】D;

【解析】因为  $2a \sin B = \sqrt{3}b$ , 所以  $\frac{\sin B}{b} = \frac{\sqrt{3}}{2a}$ , 所以  $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 所以  $A = \frac{\pi}{3}$ .

【学科网考点定位】 本题考查正弦定理的运用, 考查学生的化归与转化能力.

4. 若变量  $x, y$  满足约束条件  $\begin{cases} y \leq 2x \\ x + y \leq 1 \\ y \geq -1 \end{cases}$ , 则  $x + 2y$  的最大值是

- A.  $-\frac{5}{2}$       B. 0      C.  $\frac{5}{3}$       D.  $\frac{5}{2}$



【答案】C;

【解析】令  $x + 2y = z$ , 所以  $y = \frac{-x}{2} + \frac{z}{2}$ , 作出可行域, 可知当直线  $y = \frac{-x}{2} + \frac{z}{2}$  过点  $C(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$  时  $x + 2y$  有最大值, 最大值为  $\frac{5}{3}$ .

【学科网考点定位】 本题考查线性规划知识, 考查学生的化归与转化能力.

5. 函数  $f(x) = 2 \ln x$  的图像与函数  $g(x) = x^2 - 4x + 5$  的图像的交点个数为 ( )

- A. 3      B. 2      C. 1      D. 0

【答案】B;

【解析】在同一直角坐标系中分别作出两个函数的图像，可知有两个交点.



【学科网考点定位】 本题考查基本初等函数的图像，考查学生数形结合的能力.

6. 已知  $a, b$  是单位向量,  $a \cdot b = 0$ . 若向量  $c$  满足  $|c - a - b| = 1$ , 则  $|c|$  的取值范围是 ( )

- A.  $[\sqrt{2}-1, \sqrt{2}+1]$       B.  $[\sqrt{2}-1, \sqrt{2}+2]$   
 C.  $[1, \sqrt{2}+1]$       D.  $[1, \sqrt{2}+2]$

【答案】 A;

【解析】 因为  $|\bar{c} - \bar{a} - \bar{b}| = 1$ ,  $|\bar{c} - (\bar{a} + \bar{b})| = 1$ , 做出图形可知, 当且仅当  $\bar{c}$  与  $(\bar{a} + \bar{b})$  方向相反且  $|\bar{c}| - |\bar{a} + \bar{b}| = 1$  时,  $|\bar{c}|$  取到最大值; 最大值为  $\sqrt{2} + 1$ ; 当且仅当  $\bar{c}$  与  $(\bar{a} + \bar{b})$  方向相同且  $|\bar{a} + \bar{b}| - |\bar{c}| = 1$  时,  $|\bar{c}|$  取到最小值; 最小值为  $\sqrt{2} - 1$ .

【学科网考点定位】 本题考查向量的加法, 考查学生数形结合的能力.

7. 已知棱长为 1 的正方体的俯视图是一个面积为 1 的正方形, 则该正方体的正视图的面积不可能等于 ( )

- A. 1      B.  $\sqrt{2}$       C.  $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$       D.  $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$

【答案】 C;

【解析】 正方体的正视图面积应当介意 1 与  $\sqrt{2}$  之间, 故 C 不正确.

【学科网考点定位】 本题考查三视图, 考查学生的空间想象能力.

8. 在等腰三角形  $ABC$  中,  $AB = AC = 4$ , 点  $P$  是边  $AB$  上异于  $A, B$  的一点, 光线从点  $P$  出发, 经  $BC, CA$  发射后又回到原点  $P$  (如图1). 若光线  $QR$  经过  $\triangle ABC$  的中心, 则  $AP$  等于 ( )

- A. 2                      B. 1  
C.  $\frac{8}{3}$                       D.  $\frac{4}{3}$

**【答案】** D;

**【解析】**以 A 为原点，AB 所在直线为 x 轴，AC 所在直线为 y 轴建立直角坐标系，所以等腰三角形 ABC 的中心坐标为  $(\frac{4+0+0}{3}, \frac{0+4+0}{3})$ ，因为光线从点 P 出发，经 BC, CA 发射后又回到原点 P，故点 P 为三角形 ABC 的中心在底边 AB 上的投影，所以  $AP = \frac{4}{3}$ 。




图 1

**【学科网考点定位】** 本题考查三角形的中心，考查学生的化归与转化能力。

**本解析为学科网名师解析团队原创，授权学科网独家使用，如有盗用，依法追责！**

**二、填空题：本大题共 8 小题，考生作答 7 小题，每小题 5 分，共 35 分。**

(一) 选做题 (请考生在第 9、10、11 三题中任选两题作答，如果全做，则按前两题计分)

9. 在平面直角坐标系  $xOy$  中，若  $l: \begin{cases} x = t, \\ y = t - a \end{cases}$  ( $t$  为参数) 过椭圆  $C: \begin{cases} x = 3 \cos \varphi, \\ y = 2 \sin \varphi \end{cases}$

( $\varphi$  为参数) 的右顶点，则常数  $a$  的值为 \_\_\_\_\_.

**【答案】** 3

**【解析】** 因为椭圆  $C: \begin{cases} x = 3 \cos \varphi, \\ y = 2 \sin \varphi \end{cases}$ ，所以  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，右顶点为  $(3, 0)$ ，因为直线  $y = x - a$ ，将

点坐标代入直线方程可得  $a = 3$ 。

**【学科网考点定位】** 本题考查直线的参数方程，考查学生的转化与化归能力。

10. 已知  $a, b, c \in \mathbb{R}$ ,  $a + 2b + 3c = 6$ , 则  $a^2 + 4b^2 + 9c^2$  的最小值为 \_\_\_\_\_.

**【答案】** 12

**【解析】**  $(a^2 + 4b^2 + 9c^2)(1^2 + 1^2 + 1^2) \geq (a + 2b + 3c)^2$ ，所以  $a^2 + 4b^2 + 9c^2 \geq 12$ 。

**【学科网考点定位】** 本题考查柯西不等式的使用，考查学生的化归与转化能力。

11.如图2, 在半径为 $\sqrt{7}$ 的 $\odot O$ 中,弦 $AB, CD$ 相交于点 $P, PA = PB = 2, PD = 1$ , 则圆心 $O$ 到弦 $CD$ 的距离为\_\_\_\_\_.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ;

【解析】由相交弦定理可知,  $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ , 因为

$PA = PB = 2, PC = 1$ , 故  $PD = 4$ , 即  $CD = PD + PC = 5$ , 连接  $DO$ , 过圆

心做  $CD$  的垂线交于  $F$ , 在三角形  $OFD$  中  $OF = \frac{\sqrt{3}}{2} = d$

【学科网考点定位】 本题考查集合证明问题, 考查学生数形结合的能力.




图2

(一) 必做题 (12-16 题)

12.若  $\int_0^T x^2 dx = 9$ , 则常数  $T$  的值为\_\_\_\_\_.

【答案】3;

【解析】依题意  $\frac{x^3}{3} \Big|_0^T = \frac{1}{3}(T^3) = 9$ , 所以  $T = 3$

【学科网考点定位】 本题考查定积分的基本运算, 考查学生的基本运算能力.

13.执行如图3所示的程序框图, 如果输入  $a = 1, b = 2$ , 则输出的  $a$  的值为\_\_\_\_\_.




图3

【答案】9;

【解析】第一步,  $a = 1 + 2 = 3$ ; 第二步,  $a = 3 + 2 = 5$ ; 第三步,  $a = 5 + 2 = 7$ ; 第四步,  $a = 7 + 2 = 9$

【学科网考点定位】 本题考查算法与程序框图, 考查学生的逻辑推理能力.

14. 设  $F_1, F_2$  是双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$  的两个焦点, P 是 C 上一点, 若  $|PF_1| + |PF_2| = 6a$ ,

且  $\triangle PF_1F_2$  的最小内角为  $30^\circ$ , 则 C 的离心率为\_\_\_\_\_。

**【答案】**  $\sqrt{3}$ ;

**【解析】** 不妨设  $|PF_1| > |PF_2|$ , 则  $\begin{cases} |PF_1| - |PF_2| = 2a \\ |PF_1| + |PF_2| = 6a \end{cases}$ , 所以  $|PF_1| = 4a, |PF_2| = 2a$ , 因为

$\angle PF_1F_2 = 30^\circ$ , 所以  $|F_1F_2| = 2\sqrt{3}a$ , 所以  $e = \frac{2c}{2a} = \sqrt{3}$ .

**【学科网考点定位】** 本题考查双曲线的基本性质, 考查学生数形结合的能力.

15. 设  $S_n$  为数列  $\{a_n\}$  的前 n 项和,  $S_n = (-1)^n a_n - \frac{1}{2^n}, n \in N^*$ , 则

(1)  $a_3 =$ \_\_\_\_\_;

(2)  $S_1 + S_2 + \dots + S_{100} =$ \_\_\_\_\_。

**【答案】**  $-\frac{1}{16}; \frac{1}{3}(\frac{1}{2^{100}} - 1)$ .

**【解析】** (1) 令  $n=1$ ,  $a_1 = -\frac{1}{4}; S_4 = a_4 - \frac{1}{16}, S_3 = -a_3 - \frac{1}{8}$ , 两式对减得到  $a_3 = -\frac{1}{16}$ ;

(2) 因为  $S_n = (-1)^n a_n - \frac{1}{2^n}, S_{n-1} = (-1)^{n-1} a_{n-1} - \frac{1}{2^{n-1}}$ , 两式对减, 得到

$a_n = (-1)^n a_n - (-1)^{n-1} a_{n-1} + \frac{1}{2^n}$ , 所以  $a_{2k+1} + a_{2k+2} = 0$ , 所以

$$S_1 + S_2 + \dots + S_{100} = S_1 + S_3 + \dots + S_{99} = \frac{-\frac{1}{4} \left[ 1 - \left( \frac{1}{4} \right)^{50} \right]}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{3} \left( \frac{1}{2^{100}} - 1 \right).$$

**【学科网考点定位】** 本题考查数列的递推公式, 考查学生的基本运算能力以及逻辑推理能力.

16. 设函数  $f(x) = a^x + b^x - c^x$ , 其中  $c > a > 0, c > b > 0$ .

(1) 记集合  $M = \{(a, b, c) | a, b, c \text{ 不能构成一个三角形的三条边长, 且 } a=b\}$ , 则  $(a, b, c) \in M$  所对应的  $f(x)$  的零点的取值集合为\_\_\_\_\_。

(2) 若  $a, b, c$  是  $\triangle ABC$  的三条边长, 则下列结论正确的是\_\_\_\_\_。(写出所有正确结论

的序号)

①  $\forall x \in (-\infty, 1), f(x) > 0$ ;

②  $\exists x \in R$ , 使  $xa^x, b^x, c^x$  不能构成一个三角形的三条边长;

③ 若  $\triangle ABC$  为钝角三角形, 则  $\exists x \in (1, 2)$ , 使  $f(x) = 0$ .

**【答案】** (1)  $(0, 1]$ ; (2) ①②③;

**【解析】** (1) 因为  $a=b$ , 所以  $a+b = a+a \leq c$ , 即  $c \geq 2a$ , 此时令  $f(x) = 2a^x - c^x = 0$ ,  $\left(\frac{c}{a}\right)^x = 2$ , 做出图像可知  $x \in (0, 1]$ , 当且仅当  $a=c$  时  $x$  取到 1;

(2) 对于①,  $f(x)$  在  $(-\infty, 1)$  上为减函数, 所以  $\forall x \in (-\infty, 1), f(x) > f(1) = a+b-c > 0$  对于

②, 不妨令  $a=b=1, c=1.9, x=2$ , 此时, 其不等构成三角形的三条边; 对于③,

$f(1) \cdot f(2) = (a+b-c)(a^2+b^2-c^2)$ , 因为钝角三角形, 所以  $a^2+b^2 < c^2$ , 所以  $f(1) \cdot f(2) < 0$ ,

故③ 正确

**【学科网考点定位】** 本题考查函数的性质, 考查学生的化归与转化能力.

**本解析为学科网名师解析团队原创, 授权学科网独家使用, 如有盗用, 依法追责!**

**三、解答题:** 本大题共 6 小题, 共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本小题满分 12 分)

已知函数  $f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ ,  $g(x) = 2\sin^2 \frac{x}{2}$ .

(I) 若  $\alpha$  是第一象限角, 且  $f(\alpha) = \frac{3\sqrt{3}}{5}$ . 求  $g(\alpha)$  的值;

(II) 求使  $f(x) \geq g(x)$  成立的  $x$  的取值集合.

【答案】(1)

$$f(\alpha) = \sin(\alpha - \frac{\pi}{6}) + \cos(\alpha - \frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha - \frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha = \frac{3\sqrt{3}}{5}, \text{ 所以}$$

$$\sin \alpha = \frac{3}{5}, \text{ 因为 } \alpha \text{ 是第一象限角, 所以 } g(\alpha) = 1 - \cos \alpha = \frac{1}{5};$$

$$(2) f(x) = \sin(x - \frac{\pi}{6}) + \cos(x - \frac{\pi}{3}) = \sqrt{3} \sin x, g(x) = 2 \sin^2 \frac{x}{2} = 1 - \cos x; \text{ 因为 } f(x) \geq g(x),$$

所以  $\sqrt{3} \sin x \geq 1 - \cos x$ , 化简得  $\sin(x + \frac{\pi}{6}) \geq \frac{1}{2}$ , 所以  $\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in Z$ , 解得

$$x \text{ 的取值集合为 } \left\{ x \mid 2k\pi \leq x \leq \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in Z \right\}.$$

【解析】(1) 对  $f(x)$  化简, 先求出  $\sin \alpha$  的值, 再求  $g(\alpha)$  的值; (2) 将问题转化为  $f(x) - g(x) \geq 0$  即可求解.


【学科网考点定位】 本题考查三角函数的计算、三角恒等变换、三角函数的性质, 考查学生的基本运算能力.

18. (本小题满分 12 分)

某人在如图 4 所示的直角边长为 4 米的三角形地块的每个格点 (指纵、横的交叉点记忆三角形的顶点) 处都种了一株相同品种的作物。根据历年的种植经验, 一株该种作物的年收获量  $Y$  (单位: kg) 与它的“相近”作物株数  $X$  之间的关系如下表所示:

X	1	2	3	4
Y	51	48	45	42

这里, 两株作物“相近”是指它们之间的直线距离不超过 1 米。



(I) 从三角形地块的内部和边界上分别随机选取一株作物, 求它们恰好“相近”的概率;

(II) 从所种作物中随机选取一株，求它的年收获量的分布列与数学期望。

**【答案】**(1) 所种植物的总数为 15，其中三角形内部有 3 株，边界上有 12 株；从三角形内部和边界上分别随机选取一株不同结果有  $C_3^1 C_{12}^1 = 36$ ，满足条件的有  $3+3+2=8$ ；故从三角形地块的内部和边界上分别随机选取一株作物，求它们恰好“相近”的概率为  $\frac{8}{36} = \frac{2}{9}$ ；

(2) 先求从所种作物中选取的一株作物的年收获量  $Y$  的分布列，

因为

$$P(Y = 51) = P(X = 1), P(Y = 48) = P(X = 2), P(Y = 45) = P(X = 3), P(Y = 42) = P(X = 4),$$

所以只需求出  $P(Y = 51) = P(X = 1), P(Y = 48) = P(X = k)(k = 1, 2, 3, 4)$  即可，

记  $n_k$  为其“相近”作物恰有  $k$  株的作物株数，则  $n_1 = 2, n_2 = 4, n_3 = 6, n_4 = 3$ ；

$$\text{由 } P(x = k) = \frac{n_k}{N} \text{ 得 } P(x = 1) = \frac{2}{15}, P(x = 2) = \frac{4}{15}, P(x = 3) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}, P(x = 4) = \frac{3}{15} = \frac{1}{5},$$

所求分布列为

X	51	48	45	43
P	$\frac{2}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$

故所求期望  $E(Y) = 46$

**【解析】**(1) 利用排列组合的原理进行计算；(2) 根据

$$“ P(Y = 51) = P(X = 1), P(Y = 48) = P(X = 2), P(Y = 45) = P(X = 3), P(Y = 42) = P(X = 4) ”$$

进行转化，列出分布列，求出期望。

**【学科网考点定位】** 本题考查排列组合知识、离散型随机变量的分布列以及期望，考查学生的逻辑推理能力。


19. (本小题满分 12 分)

如图 5，在直棱柱

$$ABCD - A_1B_1C_1D_1 \text{ 中， } AD // BC, \angle BAD = 90^\circ, AC \perp BD, BC = 1, AD = AA_1 = 3.$$

(I) 证明：  $AC \perp B_1D$  ；

(II) 求直线  $B_1C_1$  与平面  $ACD_1$  所成角的正弦值。



**【答案】**(1) 因为  $B_1B \perp$  平面  $ABCD$ ，所以  $BD$  为  $B_1D$  在平面  $ABCD$  内的投影；因为  $AC \perp BD$ ，由三垂线定理可知  $AC \perp B_1D$ ；

(2) 以  $A$  为原点， $AB$  所在边为  $x$  轴， $AD$  所在边为  $y$  轴， $AA_1$  所在边为  $z$  轴建立空间直角坐标系，则  $A(0, 0, 0)$ ， $C(m, 1, 0)$ ， $D_1(0, 3, 3)$ ，所以  $\overrightarrow{AD_1} = (0, 3, 3)$ ， $\overrightarrow{AC} = (m, 1, 0)$ ；

因为  $B_1 = (m, 0, 3)$ ， $D = (0, 3, 0)$ ，所以  $\overrightarrow{B_1D} = (-m, 3, -3)$ ，因为  $AC \perp B_1D$ ，所以  $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{B_1D} = 0$ ，

故  $m = \sqrt{3}$ ，所以  $\overrightarrow{AC} = (\sqrt{3}, 1, 0)$ ，设  $\vec{n} = (x, y, z)$  为平面  $ACD_1$  的法向量，则  $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AD_1} = 0 \end{cases}$ ，令  $x = 1$ ，

所以  $\vec{n} = (1, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$  为平面  $ACD_1$  的一个法向量；因为  $B_1(\sqrt{3}, 0, 3)$ ， $C_1(\sqrt{3}, 1, 3)$ ，所以


$$\overrightarrow{B_1C_1} = (0, 1, 0) \text{ 所以直线 } B_1C_1 \text{ 与平面 } ACD_1 \text{ 所成角的正弦值 } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}.$$

**【解析】**(1) 利用线面平行证明线线平行；(2) 建立空间直角坐标系，利用向量法求线面成角的正弦。

**【学科网考点定位】** 本题考查线面平行的判定和性质、向量法求解线面成角，考查学生的空间想象能力以及基本运算能力。

20. (本小题满分 13 分)

在平面直角坐标系  $xOy$  中，将从点  $M$  出发沿纵、横方向到达点  $N$  的任一路径成为  $M$  到  $N$  的一条“L 路径”。如图 6 所示的路径  $MM_1M_2M_3N$  与路径  $MN_1N$  都是  $M$  到  $N$  的“L 路径”。某地有三个新建的居民区，分别位于平面  $xOy$  内三点  $A(3, 20)$ ， $B(-10, 0)$ ， $C(14, 0)$  处。现计划在  $x$  轴上方区域（包含  $x$  轴）内的某一点  $P$  处修建一个文化中心。



(I) 写出点 P 到居民区 A 的“L 路径”长度最小值的表达式（不要求证明）；

(II) 若以原点 O 为圆心，半径为 1 的圆的内部是保护区，“L 路径”不能进入保护区，请确定点 P 的位置，使其到三个居民区的“L 路径”长度值和最小。

**【答案】**(1) 点 P 到居民区 A 的“L 路径”长度最小值为  $|x-3|+|y-20|, x \in R, y \in [0, +\infty)$ .

(2) 依题意，点 P 到三个居民区的“L 路径”长度之和的最小值为点 P 分别到三个居民区的“L 路径”长度之和（记为 d）的最小值；

1、当  $y \geq 1$  时， $d = |x+10|+|x-14|+2|y|+|y-20|$ ，因为

$d_1(x) = |x+10|+|x-14|+|x-3| \geq |x+10|+|x-14|$  当且仅当  $x=3$  时等号成立；

又因为 $|x+10|+|x-14|\geq 24$ ，当且仅当 $x\in[-10,14]$ 时等号成立，

所以 $d_1(x)\geq 24$ ，当且仅当 $x=3$ 时等号成立。 $d_2(y)=2y+|y-20|\geq 21$ ，当且仅当 $y=1$ 时等号成立。

故当 $P$ 的坐标为 $(3,1)$ 时， $P$ 到三个居民区的“L路径”长度之和最小，且最小值为45；

2、当 $0\leq y\leq 1$ 时，由于“L路径”不能进入保护区，所以

$d=|x+10|+|x-14|+|x-3|+1+|1-y|+|y|+|y-20|$ ”，此时 $d_1(x)=|x+10|+|x-14|+|x-3|$ ，

$d_2(y)=1+|1-y|+|y|+|y-20|=22-y\geq 21$ ，有1知， $d_1(x)\geq 24$ ， $d_1(x)+d_2(y)\geq 45$ ，当且

仅当 $x=3,y=1$ 时等号成立，综上所述，在 $P(3,1)$ 处修建文化中心，可以使得“L路径”长度之和最小。

**【解析】**(1) 根据题设信息容易得到居民区A的“L路径”长度最小值为

$|x-3|+|y-20|, x\in R, y\in[0,+\infty)$ ；(2) 分当 $y\geq 1$ 时和当 $0\leq y\leq 1$ 时进行讨论，等到相应的最短路径。

**【学科网考点定位】** 本题考查绝对值不等式的求值，考查学生的数学建模能力以及逻辑推理能力。

21. (本小题满分13分)

过抛物线 $E:x^2=2py(p>0)$ 的焦点 $F$ 作斜率分别为 $k_1, k_2$ 的两条不同的直线 $l_1, l_2$ ，且

$k_1+k_2=2$ ， $l_1$ 与 $E$ 相交于点 $A, B$ ， $l_2$ 与 $E$ 相交于点 $C, D$ 。以 $AB, CD$ 为直径的圆 $M$ ，圆 $N$

( $M, N$ 为圆心)的公共弦所在的直线记为 $l$ 。

(I) 若 $k_1>0, k_2>0$ ，证明： $\overline{FM}\cdot\overline{FN}<2P^2$ ；

(II) 若点 $M$ 到直线 $l$ 的距离的最小值为 $\frac{7\sqrt{5}}{5}$ ，求抛物线 $E$ 的方程。

**【答案】**(1) 依题意，抛物线 $E$ 的焦点为 $F(0, \frac{p}{2})$ ，直线 $l_1$ 的方程为 $y=k_1x+\frac{p}{2}$ ，

由 $\begin{cases} y=k_1x+\frac{p}{2} \\ x^2=2py \end{cases}$ 得 $x^2-2pk_1x-p^2=0$ ，设 $A, B$ 两点的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ，则 $x_1, x_2$ 是

上述方程的两个实数根，从而  $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2pk_1 \\ y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) = 2pk_1^2 + p \end{cases}$ ，所以点 M 的坐标为

$(pk_1, pk_1^2 + \frac{p}{2})$ ， $\overline{FM} = (pk_1, pk_1^2)$ ，同理可得 N 的坐标为  $(pk_2, pk_2^2 + \frac{p}{2})$ ， $\overline{FN} = (pk_2, pk_2^2)$ ，

于是  $\overline{FM} \cdot \overline{FN} = p^2(k_1k_2 + k_1^2k_2^2)$ ，由题设， $k_1 + k_2 = 2, k_1 > 0, k_2 > 0, k_1 \neq k_2$ ，所以

$$0 < k_1k_2 < \frac{(k_1 + k_2)^2}{2} = 1, \text{ 故 } \overline{FM} \cdot \overline{FN} < p^2(1 + 1^2) = 2p^2;$$

(2) 由抛物线的定义得  $|FA| = y_1 + \frac{p}{2}, |FB| = y_2 + \frac{p}{2}$ ，所以  $|AB| = y_1 + y_2 + p = 2pk_1^2 + 2p$ ，从而圆

M 的半径  $r_1 = pk_1^2 + p$ ，圆 M 的方程为  $(x - pk_1)^2 + (y - pk_1^2 - \frac{p}{2})^2 = (pk_1^2 + p)^2$ ，

化简得  $x^2 + y^2 - 2pk_1x - p(2k_1^2 + 1)y - \frac{3}{4}p^2 = 0$ ，同理可得圆 N 的方程为

$x^2 + y^2 - 2pk_2x - p(2k_2^2 + 1)y - \frac{3}{4}p^2 = 0$ ，于是圆 M 与圆 N 的公共弦所在直线 l 的方程为

$(k_2 - k_1)x + (k_2^2 - k_1^2)y = 0$ ，又  $k_2 - k_1 \neq 0, k_1 + k_2 = 2$ ，则直线 l 的方程为  $x + 2y = 0$ ，因为  $p > 0$ ，

所以点 M 到直线 l 的距离  $d = \frac{|2pk_1^2 + pk_1 + p|}{\sqrt{5}} = \frac{p \geq [2(k_1 + \frac{1}{4})^2 + \frac{7}{8}]}{\sqrt{5}}$ ，故当  $k_1 = -\frac{1}{4}$  时，d 取最

小值  $\frac{7p}{8\sqrt{5}}$ 。由题设， $\frac{7p}{8\sqrt{5}} = \frac{7\sqrt{5}}{5}$ ，所以  $p = 8$ ，故所求抛物线 E 的方程为  $x^2 = 16y$

**【解析】**(1) 设出直线的方程，联立直线与抛物线的方程利用根与系数的关系进行求解；(2) 先分别求出圆 M 与圆 N 的方程，再求出公共弦的方程，配合点到直线的距离公式进行求解。

**【学科网考点定位】** 本题考查抛物线的定义、直线的方程、圆的方程、点到直线的距离公式，考查学生的基本运算能力以及化归与转化能力。

22. (本小题满分 13 分)

已知  $a > 0$ ，函数  $f(x) = \left| \frac{x - a}{x + 2a} \right|$ 。

(I): 记  $f(x)$  在区间  $[0, 4]$  上的最大值为  $g(a)$ ，求  $g(a)$  的表达式；

(II) 是否存在  $a$ ，使函数  $y = f(x)$  在区间  $(0, 4)$  内的图像上存在两点，在该两点处的切线相互垂直？若存在，求  $a$  的取值范围；若不存在，请说明理由。

【答案】(1) 当  $0 \leq x \leq a$  时,  $f(x) = \frac{a-x}{x+2a}$ ; 当  $x > a$  时,  $f(x) = \frac{x-a}{x+2a}$ .

因此, 当  $x \in (0, a)$  时,  $f'(x) = \frac{-3a}{(x+2a)^2} < 0$ , 所以  $f(x)$  在  $(0, a)$  上单调递减; 当  $x \in (a, +\infty)$

时,  $f'(x) = \frac{3a}{(x+2a)^2} > 0$ , 所以  $f(x)$  在  $(a, +\infty)$  上单调递增;

1、若  $a \geq 4$ , 则  $f(x)$  在  $(0, 4)$  上单调递减,  $g(a) = f(0) = \frac{1}{2}$ ;

2、若  $0 < a < 4$ , 则  $f(x)$  在  $(0, a)$  上单调递减, 在  $(a, 4)$  上单调递增, 所以

$g(a) = \max\{f(0), f(4)\}$ , 从而  $f(0) - f(4) = \frac{a-1}{2+a}$ ; 当  $0 < a \leq 1$  时,  $g(a) = f(4) = \frac{4-a}{4+2a}$ ;

当  $1 < a < 4$  时,  $g(a) = g(0) = \frac{1}{2}$ , 综上所述,  $g(a) = \begin{cases} \frac{4-a}{4+2a}, & 0 < a \leq 1 \\ \frac{1}{2}, & a > 1 \end{cases}$ ;

(2) 由 (1) 知, 当  $a \geq 4$  时,  $f(x)$  在  $(0, 4)$  上单调递减, 故不满足要求; 当  $0 < a < 4$  时,  $f(x)$  在  $(0, a)$  上单调递减, 在  $(a, 4)$  上单调递增. 若存在  $x_1, x_2 \in (0, 4) (x_1 < x_2)$ , 使曲线  $f(x)$  在

$(x_1, f(x_1))$ 、 $(x_2, f(x_2))$  两点处的切线相互垂直, 则  $x_1 \in (0, a), x_2 \in (a, 4)$ , 且  $f'(x_1) \cdot f'(x_2) = -1$ ,

即  $\frac{-3a}{(x_1+2a)^2} \cdot \frac{-3a}{(x_2+2a)^2} = -1$ , 亦即  $x_1+2a = \frac{3a}{x_2+2a}$  \*; 由  $x_1 \in (0, a), x_2 \in (a, 4)$  得

$x_1+2a \in (2a, 3a), \frac{3a}{x_2+2a} \in (\frac{3a}{x_2+4}, 1)$ , 故\*成立等价于集合  $A = \{x | 2a < x < 3a\}$  与集合

$B = \left\{x \mid \frac{3a}{x_2+4} < x < 1\right\}$  的交集非空; 因为  $\frac{3a}{4+2a} < 3a$ , 所以当且仅当  $0 < 2a < 1$ , 即  $0 < a < \frac{1}{2}$  时,

$A \cap B = \emptyset$ , 综上所述  $a$  的取值范围是  $(0, \frac{1}{2})$

**【解析】**(1) 分类讨论脱掉绝对值以后, 利用导数法确定  $g(a)$  的解析式; (2) 利用导数的几何意义以及不等式的性质将问题转化为集合  $A = \{x | 2a < x < 3a\}$  与集合  $B = \{x | \frac{3a}{x_2 + 4} < x < 1\}$  的交集

非空即可.

**【学科网考点定位】** 本题考查分段函数、导数与函数的单调性、导数的结合意义、函数与方程思想, 考查学生的转化与化归能力以及逻辑推理能力.