

绝密★启用前

2008年普通高等学校招生全国统一考试（上海卷）

数学试卷（理工农医类）

（满分150分，考试时间120分钟）

考生注意

1. 本场考试时间120分钟，试卷共4页，满分150分，答题纸共2页。
2. 作答前，在答题纸正面填写姓名、准考证号，反面填写姓名，将核对后的条形码贴在答题纸指定位置。
3. 所有作答务必填涂或书写在答题纸上与试卷题号对应的区域，不得错位。在试卷上作答一律不得分。
4. 用2B铅笔作答选择题，用黑色字迹钢笔、水笔或圆珠笔作答非选择题。

得分	评卷人

一. 填空题（本大题满分44分）本大题共有11题，只要求直接填写结果，每个空格填对得4分，否则一律得零分。

1. 不等式 $|x-1| < 1$ 的解集是_____.
2. 若集合 $A = \{x | x \leq 2\}$ 、 $B = \{x | x \geq a\}$ 满足 $A \cap B = \{2\}$ ，则实数 $a =$ _____.
3. 若复数 z 满足 $z = i(2-z)$ (i 是虚数单位)，则 $z =$ _____.
4. 若函数 $f(x)$ 的反函数为 $f^{-1}(x) = x^2$ ($x > 0$)，则 $f(4) =$ _____.
5. 若向量 \vec{a} 、 \vec{b} 满足 $|\vec{a}| = 1$ ， $|\vec{b}| = 2$ ，且 \vec{a} 与 \vec{b} 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$ ，则 $|\vec{a} + \vec{b}| =$ _____.
6. 函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin x + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ 的最大值是_____.
7. 在平面直角坐标系中，从六个点： $A(0,0)$ 、 $B(2,0)$ 、 $C(1,1)$ 、 $D(0,2)$ 、 $E(2,2)$ 、 $F(3,3)$ 中任取三个，这三点能构成三角形的概率是_____ (结果用分数表示).
8. 设函数 $f(x)$ 是定义在 \mathbb{R} 上的奇函数. 若当 $x \in (0, +\infty)$ 时， $f(x) = \lg x$ ，则满足 $f(x) > 0$ 的 x 的取值范围是_____.
9. 已知总体的各个体的值由小到大依次为2, 3, 3, 7, a , b , 12, 13.7, 18.3, 20, 且总体的中位数为10.5. 若要使该总体的方差最小，则 a 、 b 的取值分别是_____.

10. 某海域内有一孤岛. 岛四周的海平面 (视为平面) 上有一浅水区 (含边界), 其边界是长轴长为 $2a$ 、短轴长为 $2b$ 的椭圆. 已知岛上甲、乙导航灯的海拔高度分别为 h_1 、 h_2 , 且两个导航灯在海平面上的投影恰好落在椭圆的两个焦点上. 现有船只经过该海域 (船只的大小忽略不计), 在船上测得甲、乙导航灯的仰角分别为 θ_1 、 θ_2 , 那么船只已进入该浅水区的判别条件是_____.

11. 方程 $x^2 + \sqrt{2}x - 1 = 0$ 的解可视为函数 $y = x + \sqrt{2}$ 的图像与函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图像交点的横坐标. 若方程 $x^4 + ax - 4 = 0$ 的各个实根 x_1, x_2, \dots, x_k ($k \leq 4$) 所对应的点 $(x_i, \frac{4}{x_i})$ ($i = 1, 2, \dots, k$) 均在直线 $y = x$ 的同侧, 则实数 a 的取值范围是_____.

得分	评卷人

二. 选择题 (本大题满分16分) 本大题共有4题, 每题都给出代号为A、B、C、D的四个结论, 其中有且只有一个结论是正确的, 必须把正确结论的代号写在题后的圆括号内, 选对得4分, 不选、选错或者选出的代号超过一个 (不论是否都写在圆括号内), 一律得零分.

12. 组合数 C_n^r ($n > r \geq 1, n, r \in \mathbb{Z}$) 恒等于 [答]()

(A) $\frac{r+1}{n+1} C_{n-1}^{r-1}$. (B) $(n+1)(r+1) C_{n-1}^{r-1}$. (C) $nr C_{n-1}^{r-1}$. (D) $\frac{n}{r} C_{n-1}^{r-1}$.


13. 给定空间中的直线 l 及平面 α . 条件 “直线 l 与平面 α 内无数条直线都垂直” 是 “直线 l 与平面 α 垂直” 的 [答]()

(A) 充要条件. (B) 充分非必要条件.
(C) 必要非充分条件. (D) 既非充分又非必要条件.

14. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为1, 公比为 $a - \frac{3}{2}$ 的无穷等比数列, 且 $\{a_n\}$ 各项的和为 a , 则 a 的值是 [答]()

(A) 1. (B) 2. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{5}{4}$.

15. 如图, 在平面直角坐标系中, Ω 是一个与 x 轴的正半轴、 y 轴的正半轴分别相切于点 C 、 D 的定圆所围成的区域 (含边界), A 、 B 、 C 、 D 是该圆的四等分点. 若点 $P(x, y)$ 、点 $P'(x', y')$ 满足 $x \leq x'$ 且 $y \geq y'$, 则称 P 优于 P' . 如果 Ω 中的点 Q 满足: 不存在 Ω 中的其它点优



于 Q ，那么所有这样的点 Q 组成的集合是劣弧 [答]()

- (A) \widehat{AB} (B) \widehat{BC} (C) \widehat{CD} (D) \widehat{DA}


三. 解答题 (本大题满分90分) 本大题共有6题，解答下列各题必须写出必要的步骤.

得分	评卷人

16. (本题满分12分)

如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， E 是 BC_1 的中点. 求直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角的大小 (结果用反三角函数值表示).

[解]



得分	评卷人


17. (本题满分13分)

如图，某住宅小区的平面图呈圆心角为 120° 的扇形 AOB 。小区的两个出入口设置在点 A 及点 C 处，且小区里有一条平行于 BO 的小路 CD 。

已知某人从 C 沿 CD 走到 D 用了10分钟，从 D 沿 DA 走到 A 用了6分钟。

若此人步行的速度为每分钟50米，求该扇形的半径 OA 的长（精确到1米）。

[解]



得分	评卷人

18. (本题满分15分) 本题共有2个小题, 第1小题满分6分, 第2小题满分9分.

已知双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, P 是 C 上的任意点.

- (1) 求证: 点 P 到双曲线 C 的两条渐近线的距离的乘积是一个常数;
- (2) 设点 A 的坐标为 $(3, 0)$, 求 $|PA|$ 的最小值.

[证明] (1)

[解] (2)

得分	评卷人

19. (本题满分16分) 本题共有2个小题, 第1小题满分8分, 第2小题满分8分.

已知函数 $f(x) = 2^x - \frac{1}{2^{|x|}}$.

(1) 若 $f(x) = 2$, 求 x 的值;

(2) 若 $2^t f(2t) + mf(t) \geq 0$ 对于 $t \in [1, 2]$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

[解] (1)

(2)

得分	评卷人

20. (本题满分16分) 本题共有3个小题, 第1小题满分3分, 第2小题满分5分, 第3小题满分8分.

设 $P(a, b)$ ($b \neq 0$) 是平面直角坐标系 xOy 中的点, l 是经过原点与点 $(1, b)$ 的直线. 记 Q 是直线 l 与抛物线 $x^2 = 2py$ ($p \neq 0$) 的异于原点的交点.

(1) 已知 $a=1$, $b=2$, $p=2$. 求点 Q 的坐标;

(2) 已知点 $P(a, b)$ ($ab \neq 0$) 在椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上, $p = \frac{1}{2ab}$. 求证: 点 Q 落在双曲线 $4x^2 - 4y^2 = 1$ 上;

(3) 已知动点 $P(a, b)$ 满足 $ab \neq 0$, $p = \frac{1}{2ab}$.

若点 Q 始终落在一条关于 x 轴对称的抛物线上, 试问动点 P 的轨迹落在哪种二次曲线上, 并说明理由.

[解] (1)

[证明] (2)

[解] (3)

得分	评卷人

21. (本题满分18分) 本题共有3个小题, 第1小题满分3分, 第2小题满分7分, 第3小题满分8分.

已知以 a_1 为首项的数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_{n+1} = \begin{cases} a_n + c, & a_n < 3, \\ \frac{a_n}{d}, & a_n \geq 3. \end{cases}$

(1) 当 $a_1 = 1, c = 1, d = 3$ 时, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 当 $0 < a_1 < 1, c = 1, d = 3$ 时, 试用 a_1 表示数列 $\{a_n\}$ 前100项的和 S_{100} ;

(3) 当 $0 < a_1 < \frac{1}{m}$ (m 是正整数), $c = \frac{1}{m}$, 正整数 $d \geq 3m$ 时, 求证: 数列 $a_2 - \frac{1}{m}, a_{3m+2} - \frac{1}{m}, a_{6m+2} - \frac{1}{m}, a_{9m+2} - \frac{1}{m}$ 成等比数列当且仅当 $d = 3m$.

[解] (1)

(2)

[证明] (3)

