

# 2008年江西高考文科数学真题及答案

本试卷分第I卷（选择题）和第II卷（非选择题）两部分，第I卷1至2页，第II卷3至4页，共150分。

## 第I卷

### 考生注意：

1. 答题前，考生务必将自己的准考证号、姓名填写在答题卡上，考生要认真核对答题卡上粘贴的条形码的“准考证号、姓名、考试科目”与考生本人准考证号、姓名是否一致。
2. 第I卷每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。第II卷用黑色墨水签字笔在答题卡上作答。若在试题卷上作答，答案无效。
3. 考试结束，监考员将试题卷、答题卡一并收回。

参考公式

如果事件  $A, B$  互斥，那么

球的表面积公式

$$P(A+B) = P(A) + P(B)$$

$$S = 4\pi R^2$$

如果事件  $A, B$ ，相互独立，那么

其中  $R$  表示球的半径

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$$

球的体积公式

如果事件  $A$  在一次试验中发生的概率是  $p$ ，那么

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

$n$  次独立重复试验中恰好发生  $k$  次的概率

其中  $R$  表示球的半径

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

一. 选择题：本大题共12小题，每小题5分，共60分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. “ $|x|=|y|$ ” 是 “ $x=y$ ” 的

- A. 充分不必要条件                      B. 必要不充分条件                      C. 充要条件  
D. 既不充分也不必要条件

2. 定义集合运算： $A * B = \{z | z = xy, x \in A, y \in B\}$ . 设  $A = \{1, 2\}$ ,  $B = \{0, 2\}$ , 则集合

$A * B$  的所有元素之和为

- A. 0                      B. 2                      C. 3                      D. 6

3. 若函数  $y = f(x)$  的定义域是  $[0, 2]$ ，则函数  $g(x) = \frac{f(2x)}{x-1}$  的定义域是

- A.  $[0, 1]$                       B.  $[0, 1)$                       C.  $[0, 1) \cup (1, 4]$                       D.  $(0, 1)$

4. 若  $0 < x < y < 1$ ，则

A.  $3^y < 3^x$     B.  $\log_x 3 < \log_y 3$     C.  $\log_4 x < \log_4 y$     D.  $(\frac{1}{4})^x < (\frac{1}{4})^y$

5. 在数列  $\{a_n\}$  中,  $a_1 = 2$ ,  $a_{n+1} = a_n + \ln(1 + \frac{1}{n})$ , 则  $a_n =$

A.  $2 + \ln n$     B.  $2 + (n-1)\ln n$     C.  $2 + n \ln n$     D.  $1 + n + \ln n$

6. 函数  $f(x) = \frac{\sin x}{\sin x + 2 \sin \frac{x}{2}}$  是

A. 以  $4\pi$  为周期的偶函数    B. 以  $2\pi$  为周期的奇函数  
C. 以  $2\pi$  为周期的偶函数    D. 以  $4\pi$  为周期的奇函数

7. 已知  $F_1, F_2$  是椭圆的两个焦点, 满足  $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$  的点  $M$  总在椭圆内部, 则椭圆离心率的取值范围是

A.  $(0, 1)$     B.  $(0, \frac{1}{2}]$     C.  $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$     D.  $[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$


8.  $(1+x)^{10}(1+\frac{1}{x})^{10}$  展开式中的常数项为

A. 1    B.  $(C_{10}^1)^2$     C.  $C_{20}^1$     D.  $C_{20}^{10}$

9. 设直线  $m$  与平面  $\alpha$  相交但不垂直, 则下列说法中正确的是

- A. 在平面  $\alpha$  内有且只有一条直线与直线  $m$  垂直
- B. 过直线  $m$  有且只有一个平面与平面  $\alpha$  垂直
- C. 与直线  $m$  垂直的直线不可能与平面  $\alpha$  平行
- D. 与直线  $m$  平行的平面不可能与平面  $\alpha$  垂直

10. 函数  $y = \tan x + \sin x - |\tan x - \sin x|$  在区间  $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$  内的图象大致是



11. 电子钟一天显示的时间是从 00:00 到 23:59, 每一时刻都由四个数字组成, 则一天中任一时刻显示的四数字之和为 23 的概率为

A.  $\frac{1}{180}$     B.  $\frac{1}{288}$     C.  $\frac{1}{360}$     D.  $\frac{1}{480}$

12. 已知函数  $f(x) = 2x^2 + (4-m)x + 4-m$ ,  $g(x) = mx$ , 若对于任一实数  $x$ ,  $f(x)$  与

$g(x)$  的值至少有一个为正数, 则实数  $m$  的取值范围是

- A.  $[-4, 4]$                       B.  $(-4, 4)$                       C.  $(-\infty, 4)$                       D.  $(-\infty, -4)$

### 第 II 卷

注意事项:

第 II 卷 2 页, 须用黑色墨水签字笔在答题卡上书写作答, 若在试题上作答, 答案无效。

二. 填空题: 本大题共 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分. 请把答案填在答题卡上


13. 不等式  $2^{x^2+2x-4} \leq \frac{1}{2}$  的解集为\_\_\_\_\_.

14. 已知双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$  的两条渐近线方程为  $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$ , 若顶点到渐近线的距离为 1, 则双曲线方程为\_\_\_\_\_.

15. 连结球面上两点的线段称为球的弦. 半径为 4 的球的两条弦  $AB$ 、 $CD$  的长度分别等于  $2\sqrt{7}$ 、 $4\sqrt{3}$ , 每条弦的两端都在球面上运动, 则两弦中点之间距离的最大值为\_\_\_\_\_.

16. 如图, 正六边形  $ABCDEF$  中, 有下列四个命题:

- A.  $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{BC}$   
 B.  $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AF}$   
 C.  $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB}$   
 D.  $(\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AF})\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AD}(\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{EF})$



其中真命题的代号是\_\_\_\_\_ (写出所有真命题的代号) .

三. 解答题: 本大题共 6 小题, 共 74 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤

17. 已知  $\tan \alpha = -\frac{1}{3}$ ,  $\cos \beta = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ,  $\alpha, \beta \in (0, \pi)$

(1) 求  $\tan(\alpha + \beta)$  的值;

(2) 求函数  $f(x) = \sqrt{2} \sin(x - \alpha) + \cos(x + \beta)$  的最大值.

18. 因冰雪灾害, 某柑桔基地果林严重受损, 为此有关专家提出一种拯救果树的方案, 该方案需分两年实施且相互独立. 该方案预计第一年可以使柑桔产量恢复到灾前的 1.0 倍、0.9 倍、0.8 倍的概率分别是 0.2、0.4、0.4; 第二年可以使柑桔产量为第一年产量的 1.5 倍、1.25 倍、1.0 倍的概率分别是 0.3、0.3、0.4.

(1) 求两年后柑桔产量恰好达到灾前产量的概率;

(2) 求两年后柑桔产量超过灾前产量的概率.

19. 等差数列  $\{a_n\}$  的各项均为正数,  $a_1 = 3$ , 前  $n$  项和为  $S_n$ ,  $\{b_n\}$  为等比数列,


$$b_1 = 1, \text{ 且 } b_2 S_2 = 64,$$

$$b_3 S_3 = 960.$$

(1) 求  $a_n$  与  $b_n$ ;

(2) 求和:  $\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \dots + \frac{1}{S_n}$ .

20. 如图, 正三棱锥  $O-ABC$  的三条侧棱  $OA$ 、 $OB$ 、 $OC$  两两垂直, 且长度均为 2.  $E$ 、 $F$  分别是  $AB$ 、 $AC$  的中点,  $H$  是  $EF$  的中点, 过  $EF$  的平面与侧棱  $OA$ 、 $OB$ 、 $OC$  或其延长线分别相交于  $A_1$ 、 $B_1$ 、 $C_1$ , 已知  $OA_1 = \frac{3}{2}$ .



(1) 求证:  $B_1C_1 \perp$  面  $OAH$ ;

(2) 求二面角  $O-A_1B_1-C_1$  的大小.

21. 已知函数  $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}ax^3 - a^2x^2 + a^4 (a > 0)$

(1) 求函数  $y = f(x)$  的单调区间;


(2) 若函数  $y = f(x)$  的图像与直线  $y = 1$  恰有两个交点, 求  $a$  的取值范围.

22. 已知抛物线  $y = x^2$  和三个点  $M(x_0, y_0)$ 、 $P(0, y_0)$ 、 $N(-x_0, y_0) (y_0 \neq x_0^2, y_0 > 0)$ , 过

点  $M$  的一条直线交抛物线于  $A$ 、 $B$  两点,  $AP$ 、 $BP$  的延长线分别交抛物线于点  $E$ 、 $F$ .

(1) 证明  $E$ 、 $F$ 、 $N$  三点共线;

(2) 如果  $A$ 、 $B$ 、 $M$ 、 $N$  四点共线, 问: 是否存在  $y_0$ , 使以线段  $AB$  为直径的圆与抛物线有异于  $A$ 、 $B$  的交点? 如果存在, 求出  $y_0$  的取值范围, 并求出该交点到直线  $AB$  的距离; 若不存在, 请说明理由.



## 参考答案

一、选择题：本大题共12小题，每小题5分，共60分。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	B	D	B	C	A	A	C	D	B	D	C	C

1. B. 因  $|x|=|y|$  且  $x=y$  但  $x=y \Rightarrow |x|=|y|$ 。

2. D. 因  $A*B = \{0, 2, 4\}$ ,

3. B. 因为  $f(x)$  的定义域为  $[0, 2]$ , 所以对  $g(x)$ ,  $0 \leq 2x \leq 2$  但  $x \neq 1$  故  $x \in [0, 1)$ 。

4. C 函数  $f(x) = \log_4 x$  为增函数

5. A  $a_2 = a_1 + \ln(1 + \frac{1}{1})$ ,  $a_3 = a_2 + \ln(1 + \frac{1}{2})$ ,  $\dots$ ,  $a_n = a_{n-1} + \ln(1 + \frac{1}{n-1})$

$$\Rightarrow a_n = a_1 + \ln(\frac{2}{1})(\frac{3}{2})(\frac{4}{3}) \dots (\frac{n}{n-1}) = 2 + \ln n$$

6. A  $f(-x) = \frac{\sin(-x)}{\sin(-x) + 2\sin\frac{-x}{2}} = f(x)$   $f(4\pi + x) = f(x) \neq f(2\pi + x)$

7. C. 由题知, 垂足的轨迹为以焦距为直径的圆, 则  $c < b \Rightarrow c^2 < b^2 = a^2 - c^2 \Rightarrow e^2 < \frac{1}{2}$   
又  $e \in (0, 1)$ , 所以  $e \in (0, \frac{1}{2})$

8. D  $(1+x)^{10}(1+\frac{1}{x})^{10} = \frac{(1+x)^{20}}{x^{10}}$

9. C.

10. D. 函数  $y = \tan x + \sin x - |\tan x - \sin x| = \begin{cases} 2 \tan x, & \text{当 } \tan x < \sin x \text{ 时} \\ 2 \sin x, & \text{当 } \tan x \geq \sin x \text{ 时} \end{cases}$

11. C. 一天显示的时间总共有  $24 \times 60 = 1440$  种, 和为23总共有4种, 故所求概率为  $\frac{1}{360}$ 。

12. C. 当  $\Delta = m^2 - 16 < 0$  时, 显然成立

当  $m = 4, f(0) = g(0) = 0$  时, 显然不成立; 当  $m = -4, f(x) = 2(x+2)^2, g(x) = -4x$  显然成立;

当  $m < -4$  时  $x_1 + x_2 < 0, x_1 x_2 > 0$ , 则  $f(x) = 0$  两根为负, 结论成立

故  $-\infty < m < 4$

二、填空题：本大题共4小题，每小题4分，共16分。

13.  $[-3,1]$       14.  $\frac{x^2}{4} - \frac{3y^2}{4} = 1$       15. 5      16. A、B、D

13. 依题意  $x^2 + 2x - 4 \leq -1 \Rightarrow (x+3)(x-1) \leq 0 \Rightarrow x \in [-3,1]$

14.  $\frac{x^2}{4} - \frac{3y^2}{4} = 1$

15.

易求得  $M$ 、 $N$  到球心  $O$  的距离分别为 3、2，类比平面内圆的情形可知当  $M$ 、 $N$  与球心  $O$  共线时， $|MN|$  取最大值 5。

16.  $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{BC}$ ， $\therefore A$  对

取  $AD$  的中点  $O$ ，则  $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AO} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF}$ ， $\therefore B$  对

设  $|\overrightarrow{AB}| = 1$ ，则  $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \sqrt{3} \times 2 \times \cos \frac{\pi}{6} = 3$ ，而  $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AF} = 2 \times 1 \times \cos \frac{\pi}{3} = 1$ ， $\therefore C$  错

又  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 1 \times 2 \times \cos \frac{\pi}{3} = 1 = (\overrightarrow{AF})^2$ ， $\therefore D$  对

$\therefore$  真命题的代号是  $A, B, D$

三、解答题：本大题共 6 小题，共 74 分。

17. 解：（1）由  $\cos \beta = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ， $\beta \in (0, \pi)$

$$\text{得 } \tan \beta = 2, \sin \beta = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\text{于是 } \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{-\frac{1}{3} + 2}{1 + \frac{2}{3}} = 1.$$

（2）因为  $\tan \alpha = -\frac{1}{3}$ ， $\alpha \in (0, \pi)$

$$\text{所以 } \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{10}}, \cos \alpha = -\frac{3}{\sqrt{10}}$$

$$f(x) = -\frac{3\sqrt{5}}{5} \sin x - \frac{\sqrt{5}}{5} \cos x + \frac{\sqrt{5}}{5} \cos x - \frac{2\sqrt{5}}{5} \sin x$$

$$= -\sqrt{5} \sin x$$

$f(x)$  的最大值为  $\sqrt{5}$ 。

18. 解：（1）令A表示两年后柑桔产量恰好达到灾前产量这一事件

$$P(A) = 0.2 \times 0.4 + 0.4 \times 0.3 = 0.2$$

（2）令B表示两年后柑桔产量超过灾前产量这一事件

$$P(B) = 0.2 \times 0.6 + 0.4 \times 0.6 + 0.4 \times 0.3 = 0.48$$

19. （1）设  $\{a_n\}$  的公差为  $d$ ， $\{b_n\}$  的公比为  $q$ ，则  $d$  为正整数，

$$a_n = 3 + (n-1)d, \quad b_n = q^{n-1}$$

$$\text{依题意有} \begin{cases} S_3 b_3 = (9+3d)q^2 = 960 \\ S_2 b_2 = (6+d)q = 64 \end{cases} \text{①}$$

$$\text{解得} \begin{cases} d=2 \\ q=8 \end{cases}, \text{或} \begin{cases} d=-\frac{6}{5} \\ q=\frac{40}{3} \end{cases} \text{(舍去)}$$

$$\text{故 } a_n = 3 + 2(n-1) = 2n+1, \quad b_n = 8^{n-1}$$

$$(2) S_n = 3 + 5 + \dots + (2n+1) = n(n+2)$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \dots + \frac{1}{S_n} &= \frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{2 \times 4} + \frac{1}{3 \times 5} + \dots + \frac{1}{n(n+2)} \\ &= \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{3}{4} - \frac{2n+3}{2(n+1)(n+2)} \end{aligned}$$

20. 解：（1）证明：依题设， $EF$  是  $\triangle ABC$  的中位线，所以  $EF \parallel BC$ ，

则  $EF \parallel$  平面  $OBC$ ，所以  $EF \parallel B_1C_1$ 。

又  $H$  是  $EF$  的中点，所以  $AH \perp EF$ ，


则  $AH \perp B_1C_1$ 。

因为  $OA \perp OB$ ， $OA \perp OC$ ，

所以  $OA \perp$  面  $OBC$ ，则  $OA \perp B_1C_1$ ，

因此  $B_1C_1 \perp$  面  $OAH$ 。

（2）作  $ON \perp A_1B_1$  于  $N$ ，连  $C_1N$ 。



因为  $OC_1 \perp$  平面  $OA_1B_1$ ,

根据三垂线定理知,  $C_1N \perp A_1B_1$ ,

$\angle ONC_1$  就是二面角  $O-A_1B_1-C_1$  的平面角。

作  $EM \perp OB_1$  于  $M$ , 则  $EM \parallel OA$ , 则  $M$  是  $OB$  的中点, 则  $EM = OM = 1$ 。

设  $OB_1 = x$ , 由  $\frac{OB_1}{MB_1} = \frac{OA_1}{EM}$  得,  $\frac{x}{x-1} = \frac{3}{2}$ , 解得  $x = 3$ ,

在  $Rt\triangle OA_1B_1$  中,  $A_1B_1 = \sqrt{OA_1^2 + OB_1^2} = \frac{3}{2}\sqrt{5}$ , 则,  $ON = \frac{OA_1 \cdot OB_1}{A_1B_1} = \frac{3}{\sqrt{5}}$ 。

所以  $\tan \angle ONC_1 = \frac{OC_1}{ON} = \sqrt{5}$ , 故二面角  $O-A_1B_1-C_1$  为  $\arctan \sqrt{5}$ 。

解法二: (1) 以直线  $OA$ 、 $OC$ 、 $OB$  分别为  $x$ 、 $y$ 、 $z$  轴, 建立空间直角坐标系,

$O-xyz$  则

$A(2,0,0), B(0,0,2), C(0,2,0), E(1,0,1), F(1,1,0), H(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

所以  $\overrightarrow{AH} = (-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}), \overrightarrow{OH} = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}), \overrightarrow{BC} = (0, 2, -2)$

所以  $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0, \overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$

所以  $BC \perp$  平面  $OAH$

由  $EF \parallel BC$  得  $B_1C_1 \parallel BC$ , 故:  $B_1C_1 \perp$  平面  $OAH$

(2) 由已知  $A_1(\frac{3}{2}, 0, 0)$ , 设  $B_1(0, 0, z)$


则  $\overrightarrow{A_1E} = (-\frac{1}{2}, 0, 1), \overrightarrow{EB_1} = (-1, 0, z-1)$

由  $\overrightarrow{A_1E}$  与  $\overrightarrow{EB_1}$  共线得: 存在  $\lambda \in R$  有  $\overrightarrow{A_1E} = \lambda \overrightarrow{EB_1}$  得

$$\begin{cases} -\frac{1}{2} = -\lambda \\ 1 = \lambda(z-1) \end{cases} \Rightarrow z = 3$$

$\therefore B_1(0, 0, 3)$

同理:  $C_1(0, 3, 0)$



$$\therefore \overrightarrow{A_1B_1} = (-\frac{3}{2}, 0, 3), \overrightarrow{A_1C_1} = (-\frac{3}{2}, 3, 0)$$

设  $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$  是平面  $A_1B_1C_1$  的一个法向量,

$$\text{则} \begin{cases} -\frac{3}{2}x + 3z = 0 \\ -\frac{3}{2}x + 3y = 0 \end{cases} \quad \text{令 } x = 2 \text{ 得 } y = x = 1$$

$$\therefore \vec{n}_1 = (2, 1, 1).$$

又  $\vec{n}_2 = (0, 1, 0)$  是平面  $OA_1B_1$  的一个法量

$$\therefore \cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{4+1+1}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

所以二面角的大小为  $\arccos \frac{\sqrt{6}}{6}$

21. 解: (1) 因为  $f'(x) = x^3 + ax^2 - 2a^2x = x(x+2a)(x-a)$

令  $f'(x) = 0$  得  $x_1 = -2a, x_2 = 0, x_3 = a$

由  $a > 0$  时,  $f'(x)$  在  $f'(x) = 0$  根的左右的符号如下表所示

$x$	$(-\infty, -2a)$	$-2a$	$(-2a, 0)$	$0$	$(0, a)$	$a$	$(a, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	极小值	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

所以  $f(x)$  的递增区间为  $(-2a, 0)$  与  $(a, +\infty)$

$f(x)$  的递减区间为  $(-\infty, -2a)$  与  $(0, a)$

$$(2) \text{ 由 (1) 得到 } f(x)_{\text{极小值}} = f(-2a) = -\frac{5}{3}a^4, f(x)_{\text{极小值}} = f(a) = \frac{7}{12}a^4$$

$$f(x)_{\text{极大值}} = f(0) = a^4$$

要使  $f(x)$  的图像与直线  $y = 1$  恰有两个交点, 只要  $-\frac{5}{3}a^4 < 1 < \frac{7}{12}a^4$  或  $a^4 < 1$ ,

即  $a > \sqrt[4]{\frac{12}{7}}$  或  $0 \leq a < 1$ .

22. (1) 证明: 设  $A(x_1, x_1^2)$ 、 $B(x_2, x_2^2)$ ,  $E(x_E, y_E)$ 、 $F(x_F, y_F)$

则直线  $AB$  的方程:  $y = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2}(x - x_1) + x_1^2$

即:  $y = (x_1 + x_2)x - x_1x_2$

因  $M(x_0, y_0)$  在  $AB$  上, 所以  $y_0 = (x_1 + x_2)x_0 - x_1x_2 \cdots \cdots \textcircled{1}$

又直线  $AP$  方程:  $y = \frac{x_1^2 - y_0}{x_1}x + y_0$

由  $\begin{cases} y = \frac{x_1^2 - y_0}{x_1}x + y_0 \\ x^2 = y \end{cases}$  得:  $x^2 - \frac{x_1^2 - y_0}{x_1}x - y_0 = 0$

所以  $x_1 + x_E = \frac{x_1^2 - y_0}{x_1} \Rightarrow x_E = -\frac{y_0}{x_1}, y_E = \frac{y_0^2}{x_1^2}$

同理,  $x_F = -\frac{y_0}{x_2}, y_F = \frac{y_0^2}{x_2^2}$

所以直线  $EF$  的方程:  $y = -\left(\frac{x_1 + x_2}{x_1x_2}\right)y_0x - \frac{y_0^2}{x_1x_2}$

令  $x = -x_0$  得  $y = \frac{y_0}{x_1x_2}[(x_1 + x_2)x_0 - y_0]$

将  $\textcircled{1}$  代入上式得  $y = y_0$ , 即  $N$  点在直线  $EF$  上

所以  $E, F, N$  三点共线

(2) 解: 由已知  $A, B, M, N$  共线, 所以  $A(-\sqrt{y_0}, y_0), B(\sqrt{y_0}, y_0)$

以  $AB$  为直径的圆的方程:  $x^2 + (y - y_0)^2 = y_0$

由  $\begin{cases} x^2 + (y - y_0)^2 = y_0 \\ x^2 = y \end{cases}$  得  $y^2 - (2y_0 - 1)y + y_0^2 - y_0 = 0$

所以  $y = y_0$  (舍去),  $y = y_0 - 1$

要使圆与抛物线有异于  $A, B$  的交点, 则  $y_0 - 1 \geq 0$

所以存在  $y_0 \geq 1$ , 使以  $AB$  为直径的圆与抛物线有异于  $A, B$  的交点  $T(x_T, y_T)$

则  $y_T = y_0 - 1$ , 所以交点  $T$  到  $AB$  的距离为  $y_0 - y_T = y_0 - (y_0 - 1) = 1$