

# 1991年广西高考文科数学真题及答案

考生注意：这份试卷共三道大题(26个小题)．满分120分．

一、选择题：本大题共15小题；每小题3分，共45分．在每小题给出的四个选项中，只有一是符合题目要求的．把所选项前的字母填在题后括号内．

- (1) 已知 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ ，并且 $\alpha$ 是第二象限的角，那么 $\operatorname{tg} \alpha$ 的值等于 ( )  
(A)  $-\frac{4}{3}$  (B)  $-\frac{3}{4}$  (C)  $\frac{3}{4}$  (D)  $\frac{4}{3}$
- (2) 焦点在 $(-1, 0)$ ，顶点在 $(1, 0)$ 的抛物线方程是 ( )  
(A)  $y^2=8(x+1)$  (B)  $y^2=-8(x+1)$   
(C)  $y^2=8(x-1)$  (D)  $y^2=-8(x-1)$
- (3) 函数 $y=\cos^4 x - \sin^4 x$ 的最小正周期是 ( )  
(A)  $\frac{\pi}{2}$  (B)  $\pi$  (C)  $2\pi$  (D)  $4\pi$
- (4)  $P(2, 5)$ 关于直线 $x+y=0$ 的对称点的坐标是 ( )  
(A)  $(5, 2)$  (B)  $(2, -5)$  (C)  $(-5, -2)$  (D)  $(-2, -5)$
- (5) 如果把两条异面直线看成“一对”，那么六棱锥的棱所在的12条直线中，异面直线共有 ( )  
(A) 12对 (B) 24对 (C) 36对 (D) 48对
- (6) 函数 $y=\sin(2x+\frac{5\pi}{2})$ 的图像的一条对称轴的方程是 ( )  
(A)  $x=-\frac{\pi}{2}$  (B)  $x=-\frac{\pi}{4}$   
(C)  $x=\frac{\pi}{8}$  (D)  $x=\frac{5\pi}{4}$
- (7) 如果三棱锥 $S-ABC$ 的底面是不等边三角形，侧面与底面所成的二面角都相等，且顶点 $S$ 在底面的射影 $O$ 在 $\triangle ABC$ 内，那么 $O$ 是 $\triangle ABC$ 的 ( )  
(A) 垂心 (B) 重心 (C) 外心 (D) 内心
- (8) 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列，且 $a_n > 0$ ， $a_2 a_4 + 2 a_3 a_5 + a_4 a_6 = 25$ ，那么 $a_3 + a_5$ 的值等于 ( )  
(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20

(9) 已知函数  $y = \frac{6x+5}{x-1}$  ( $x \in \mathbb{R}$ , 且  $x \neq 1$ ), 那么它的反函数为 ( )

(A)  $y = \frac{6x+5}{x-1}$  ( $x \in \mathbb{R}$ , 且  $x \neq 1$ )

(B)  $y = \frac{x+5}{x-6}$  ( $x \in \mathbb{R}$ , 且  $x \neq 6$ )

(C)  $y = \frac{x-1}{6x+5}$  ( $x \in \mathbb{R}$ , 且  $x \neq -\frac{5}{6}$ )

(D)  $y = \frac{x-6}{x+5}$  ( $x \in \mathbb{R}$ , 且  $x \neq -5$ )

(10) 从4台甲型和5台乙型电视机中任意取出3台, 其中至少要有甲型与乙型电视机各1台, 则不同的取法共有 ( )

- (A) 140种 (B) 84种 (C) 70种 (D) 35种

(11) 设甲、乙、丙是三个命题. 如果甲是乙的必要条件; 丙是乙的充分条件但不是乙的必要条件, 那么 ( )

(A) 丙是甲的充分条件, 但不是甲的必要条件

(B) 丙是甲的必要条件, 但不是甲的充分条件

(C) 丙是甲的充要条件

(D) 丙不是甲的充分条件, 也不是甲的必要条件

(12)  $\lim_{n \rightarrow \infty} [n(1 - \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{4})(1 - \frac{1}{5}) \cdots (1 - \frac{1}{n+2})]$  的值等于 ( )

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

(13) 如果  $AC < 0$  且  $BC < 0$ , 那么直线  $Ax + By + C = 0$  不通过 ( )

- (A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限

(14) 如果奇函数  $f(x)$  在区间  $[3, 7]$  上是增函数且最小值为5, 那么  $f(x)$  在区间  $[-7, -3]$  上是 ( )

(A) 增函数且最小值为-5 (B) 增函数且最大值为-5

(C) 减函数且最小值为-5 (D) 减函数且最大值为-5

(15) 圆  $x^2 + 2x + y^2 + 4y - 3 = 0$  上到直线  $x + y + 1 = 0$  的距离为  $\sqrt{2}$  的点共有 ( )

- (A) 1个 (B) 2个 (C) 3个 (D) 4个

二、填空题: 本大题共5小题; 每小题3分, 共15分. 把答案填在题中横线上.

(16) 双曲线以直线  $x=-1$  和  $y=2$  为对称轴, 如果它的一个焦点在  $y$  轴上, 那么它的另一焦点的坐标是\_\_\_\_\_.

(17) 已知  $\sin x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ , 则  $\sin 2(x - \frac{\pi}{4}) =$ \_\_\_\_\_.

(18) 不等式  $\lg(x^2+2x+2) < 1$  的解集是\_\_\_\_\_.

(19) 在  $(ax+1)^7$  的展开式中,  $x^3$  的系数是  $x^2$  的系数与  $x^4$  的系数的等差中项, 若实数  $a > 1$ , 那么  $a =$ \_\_\_\_\_.

(20) 在长方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中, 已知顶点  $A$  上三条棱长分别是  $\sqrt{2}, \sqrt{3}, 2$ . 如果对角线  $AC_1$  与过点  $A$  的相邻三个面所成的角分别是  $\alpha, \beta, \gamma$ , 那么  $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma =$ \_\_\_\_\_.

三、解答题: 本大题共6小题; 共60分.

(21) (本小题满分8分)

求函数  $y = \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + 3 \cos^2 x$  的最大值.


(22) (本小题满分8分)

已知复数  $z = 1 + i$ , 求复数  $\frac{z^2 - 3z + 6}{z + 1}$  的模和辐角

的主值.

(23) (本小题满分10分)

如图, 在三棱台  $A_1B_1C_1-ABC$  中, 已知  $A_1A \perp$  底面  $ABC$ ,  $A_1A = A_1B_1 = B_1C_1 = a$ ,  $B_1B \perp BC$ , 且  $B_1B$  和底面  $ABC$  所成的角  $45^\circ$ , 求这个棱台的体积.



(24) (本小题满分10分)

设  $\{a_n\}$  是等差数列,  $b_n = (\frac{1}{2})^{a_n}$ . 已知  $b_1 + b_2 + b_3 = \frac{21}{8}$ ,  $b_1 b_2 b_3 = \frac{1}{8}$ . 求等差数列的通项  $a_n$ .

(25) (本小题满分12分)

设  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ , 解关于  $x$  的不等式  $a^{x^4-2x^2} > (\frac{1}{a})^{a^2}$ .

(26) (本小题满分12分)

已知椭圆的中心在坐标原点  $O$ ，焦点在坐标轴上，直线  $y=x+1$  与该椭圆相交于  $P$  和  $Q$ ，且  $OP \perp OQ$ ， $|PQ| = \frac{\sqrt{10}}{2}$ 。求椭圆的方程。

### 参考答案及评分标准

说明：

一. 本解答指出了每题所要考查的主要知识和能力，并给出了一种或几种较为常见的解法，如果考生的解法与本解答不同，可根据试题的主要考查内容参照评分标准制定相应评分细则。

二. 每题都要评阅到底，不要因为考生的解答中出现错误而中断对该题的评阅。当考生的解答在某一步出现错误，影响了后继部分时，如果该步以后的解答未改变这一题的内容和难度时，可视影响的程度决定后面部分的给分，但不得超过后面部分应给分数的一半；如果这一步以后的解答有较严重的错误，就不给分。

三. 为了阅卷方便，本试题解答中的推导步骤写得较为详细，允许考生在解题过程中合理省略非关键性的推导步骤。

四. 解答右端所注分数，表示考生正确做到这一步应得的累加分数。

五. 只给整数分数。

一. 选择题. 本题考查基本知识和基本运算. 每小题3分，满分45分.

(1)A (2)D (3)B (4)C (5)B (6)A (7)D (8)A (9)B (10)C (11)A (12)C  
(13)C (14)B (15)C

二. 填空题. 本题考查基本知识基本运算. 每小题3分，满分15分.

(16)  $(-2, 2)$  (17)  $2 - \sqrt{5}$  (18)  $\{x | -4 < x < 2\}$  (19)  $1 + \frac{\sqrt{10}}{5}$  (20)

2

三. 解答题

(21) 本小题考查三角函数式的恒等变形及三角函数的性质. 满分8分.

解:  $y = \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + 3 \cos^2 x$

$= (\sin^2 x + \cos^2 x) + 2 \sin x \cos x + 2 \cos^2 x$  ——2分

分

$= 1 + \sin 2x + (1 + \cos 2x)$  ——4分

$= 2 + \sin 2x + \cos 2x$

$= 2 + \sqrt{2} \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ . ——6分

当  $\sin(2x + \frac{\pi}{4}) = 1$  时, 函数  $y$  有最大值, 这时  $y$  的最大值等于  $2 + \sqrt{2}$ . ——8分

注: 没有说明 “当  $\sin(2x + \frac{\pi}{4}) = 1$  时, 函数  $y$  有最大值” 而得出正确答案, 不扣分.

(22) 本小题考查复数基本概念和运算能力. 满分8分.

解:  $\frac{z^2 - 3z + 6}{z + 1} = \frac{(1 + i)^2 - 3(1 + i) + 6}{1 + i + 1}$

$= \frac{3 - i}{2 + i}$  ——2分

$= 1 - i$ . ——4分

$1 - i$  的模  $r = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$ . 因为  $1 - i$  对应的点在第四象限且辐角的正切

$\text{tg } \theta = -1$ , 所以辐角的主值  $\theta = \frac{7}{4} \pi$ . ——8分

(23) 本小题考查直线与直线, 直线与平面的位置关系, 以及逻辑推理和空间想象能力. 满分10分.

解: 因为  $A_1 A \perp$  底面  $ABC$ , 所以根据平面的垂线的定义有  $A_1 A \perp BC$ . 又  $BC \perp BB_1$ , 且棱  $AA_1$  和  $BB_1$  的延长线交于一点, 所以利用直线和平面垂直的判定定理可以推出  $BC \perp$  侧面  $A_1 A B B_1$ , 从而根据平面的垂线的定义又可得出  $BC \perp AB$ .

$\therefore \triangle ABC$  是直角三角形,  $\angle ABC = 90^\circ$ . 并且  $\angle ABB_1$  就是  $BB_1$  和底面  $ABC$  所成的角,

$\angle ABB_1 = 45^\circ$ . ——3分

作  $B_1 D \perp AB$  交  $AB$  于  $D$ , 则  $B_1 D \parallel A_1 A$ , 故  $B_1 D \perp$  底面  $ABC$ .


$\therefore$  Rt  $\triangle B_1 D B$  中  $\angle D B B_1 = 45^\circ$ ,

$\therefore DB = D B_1 = A A_1 = a$ ,

$\therefore AB = 2a$ .

——6分

由于棱台的两个底面相似, 故



$$\text{Rt}\triangle ABC \sim \text{Rt}\triangle A_1B_1C_1.$$

$$\therefore B_1C_1 = A_1B_1 = a, \quad AB = 2a,$$

$$\therefore BC = 2a.$$

$$\therefore S_{\text{上}} = \frac{1}{2} A_1B_1 \times B_1C_1 = \frac{a^2}{2}.$$

$$S_{\text{下}} = \frac{1}{2} AB \times BC = 2a^2. \quad \text{---8分}$$

$$V_{\text{棱台}} = \frac{1}{3} \cdot A_1A \cdot (S_{\text{上}} + \sqrt{S_{\text{上}} \cdot S_{\text{下}}} + S_{\text{下}})$$

$$= \frac{1}{3} \cdot a \cdot \left( \frac{a^2}{2} + \sqrt{\frac{a^2}{2} \times 2a^2} + 2a^2 \right) = \frac{7}{6} a^3. \quad \text{---10分}$$

分

(24) 本小题考查等差数列, 等比数列的概念及运用方程(组)解决问题的能力. 满分10分.

解 设等差数列  $\{a_n\}$  的公差为  $d$ , 则  $a_n = a_1 + (n-1)d$ .

$$\therefore b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{a_1 + (n-1)d}$$

$$b_1 b_3 = \left(\frac{1}{2}\right)^{a_1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{a_1 + 2d} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2(a_1 + d)} = b_2^2.$$

$$\text{由 } b_1 b_2 b_3 = \frac{1}{8}, \text{ 得 } b_2^3 = \frac{1}{8},$$

$$\text{解得 } b_2 = \frac{1}{2}. \quad \text{---3分}$$

代入已知条件

$$\begin{cases} b_1 b_2 b_3 = \frac{1}{8}, \\ b_1 + b_2 + b_3 = \frac{21}{8}. \end{cases}$$

整理得

$$\begin{cases} b_1 b_3 = \frac{1}{4}, \\ b_1 + b_3 = \frac{17}{8}. \end{cases}$$

解这个方程组得  $b_1=2$ ,  $b_3=\frac{1}{8}$  或  $b_1=\frac{1}{8}$ ,  $b_3=2$  ——6分

$\therefore a_1=-1, d=2$  或  $a_1=3, d=-2$ . ——8分

所以, 当  $a_1=-1, d=2$  时

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 2n - 3.$$

当  $a_1=3, d=-2$  时

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 5 - 2n. \quad \text{——10分}$$

(25) 本小题考查指数函数性质、解不等式及综合分析能力. 满分12分.

解法一 原不等式可写成  $a^{x^4-2x^2} > a^{-a^2}$ . ① ——1分

根据指数函数性质, 分为两种情形讨论:

(I) 当  $0 < a < 1$  时, 由①式得

$$x^4 - 2x^2 + a^2 < 0, \quad \text{②} \quad \text{——3分}$$

由于  $0 < a < 1$  时, 判别式

$$\Delta = 4 - 4a^2 > 0,$$

所以②式等价于

$$\begin{cases} x^2 > 1 - \sqrt{1 - a^2}, & \text{③} \\ x^2 < 1 + \sqrt{1 - a^2}. & \text{④} \end{cases} \quad \text{——5分}$$

解③式得  $x < -\sqrt{1 - \sqrt{1 - a^2}}$  或  $x > \sqrt{1 - \sqrt{1 - a^2}}$ ,

解④式得  $-\sqrt{1 + \sqrt{1 - a^2}} < x < \sqrt{1 + \sqrt{1 - a^2}}$ . ——7分

所以,  $0 < a < 1$  时, 原不等式的解集为

$$\{x \mid -\sqrt{1 + \sqrt{1 - a^2}} < x < -\sqrt{1 - \sqrt{1 - a^2}}\} \cup \{x \mid \sqrt{1 - \sqrt{1 - a^2}} < x < \sqrt{1 + \sqrt{1 - a^2}}\}. \quad \text{——8分}$$

(II) 当  $a > 1$  时, 由①式得

$$x^4 - 2x^2 + a^2 > 0, \quad \text{⑤} \quad \text{——9分}$$

由于  $a > 1$ , 判别式  $\Delta < 0$ , 故⑤式对任意实数  $x$  成立, 即得原不等式的解集为

$$\{x \mid -\infty < x < +\infty\}. \quad \text{——12分}$$

综合得

当  $0 < a < 1$  时, 原不等式的解集为

$$\{x|-\sqrt{1+\sqrt{1-a^2}} < x < -\sqrt{1-\sqrt{1-a^2}}\} \cup \{x|\sqrt{1-\sqrt{1-a^2}} < x < \sqrt{1+\sqrt{1-a^2}}\};$$

当  $a > 1$  时, 原不等式的解集为

$$\{x|-\infty < x < +\infty\}.$$

解法二 原不等式可写成  $a^{x^4-2x^2} > a^{-a^2}$ . ① ——1分

(I) 当  $0 < a < 1$  时, 由①式得

$$x^4 - 2x^2 + a^2 < 0, \quad \text{②} \quad \text{——3分}$$

$$\text{分解因式得 } (x^2 - 1 + \sqrt{1-a^2})(x^2 - 1 - \sqrt{1-a^2}) < 0. \quad \text{③}$$

$$\text{即 } \begin{cases} x^2 - 1 + \sqrt{1-a^2} > 0, & \text{④} \\ x^2 - 1 - \sqrt{1-a^2} < 0; & \text{⑤} \end{cases}$$

$$\text{或 } \begin{cases} x^2 - 1 + \sqrt{1-a^2} < 0, & \text{⑥} \\ x^2 - 1 - \sqrt{1-a^2} > 0. & \text{⑦} \end{cases} \quad \text{——5分}$$

解由④、⑤组成的不等式组得

$$-\sqrt{1+\sqrt{1-a^2}} < x < -\sqrt{1-\sqrt{1-a^2}}.$$

$$\text{或 } \sqrt{1-\sqrt{1-a^2}} < x < \sqrt{1+\sqrt{1-a^2}}. \quad \text{——7分}$$

由⑥、⑦组成的不等式组解集为空集; 所以,  $0 < a < 1$  时, 原不等式的解集为

$$\{x|-\sqrt{1+\sqrt{1-a^2}} < x < -\sqrt{1-\sqrt{1-a^2}}\} \cup \{x|\sqrt{1-\sqrt{1-a^2}} < x < \sqrt{1+\sqrt{1-a^2}}\};$$

——8分

(II) 当  $a > 1$  时, 由①式得

$$x^4 - 2x^2 + a^2 > 0, \quad \text{⑧} \quad \text{——9分}$$

$$\text{配方得 } (x^2 - 1)^2 + a^2 - 1 > 0, \quad \text{⑨}$$

对任意实数  $x$ , 不等式⑨都成立, 即  $a > 1$  时, 原不等式的解集为

$$\{x|-\infty < x < +\infty\}. \quad \text{——12分}$$

综合得

当  $0 < a < 1$  时, 原不等式的解集为

$$\{x|-\sqrt{1+\sqrt{1-a^2}} < x < -\sqrt{1-\sqrt{1-a^2}}\} \cup \{x|\sqrt{1-\sqrt{1-a^2}} < x < \sqrt{1+\sqrt{1-a^2}}\};$$

当  $a > 1$  时, 原不等式的解集为  $\{x|-\infty < x < +\infty\}$ .

(26) 本小题考查椭圆的性质、两点的距离公式、两条直线垂直条件、二次方程根与系

数的关系及分析问题的能力. 满分 12 分.

解法一 设所求椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

依题意知, 点  $P$ 、 $Q$  的坐标满足方程组

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, & \text{①} \\ y = x + 1. & \text{②} \end{cases}$$

将②式代入①式, 整理得

$$(a^2 + b^2)x^2 + 2a^2x + a^2(1 - b^2) = 0, \quad \text{③} \quad \text{---2}$$

分

设方程③的两个根分别为  $x_1$ ,  $x_2$ , 那么直线  $y = x + 1$  与椭圆的交点为

$$P(x_1, x_1 + 1), Q(x_2, x_2 + 1). \quad \text{---3 分}$$

由题设  $OP \perp OQ$ ,  $|PQ| = \frac{\sqrt{10}}{2}$ , 可得

$$\begin{cases} \frac{x_1 + 1}{x_1} \cdot \frac{x_2 + 1}{x_2} = -1, \\ (x_2 - x_1)^2 + [(x_2 + 1) - (x_1 + 1)]^2 = \left(\frac{\sqrt{10}}{2}\right)^2. \end{cases}$$

整理得

$$\begin{cases} (x_1 + x_2) + 2x_1x_2 + 1 = 0, & \text{④} \\ 4(x_1 + x_2)^2 - 16x_1x_2 - 5 = 0. & \text{⑤} \end{cases} \quad \text{---6}$$

分

解这个方程组, 得

$$\begin{cases} x_1x_2 = \frac{1}{4}, \\ x_1 + x_2 = -\frac{3}{2}; \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x_1x_2 = -\frac{1}{4}, \\ x_1 + x_2 = -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

根据根与系数的关系, 由③式得

$$(I) \begin{cases} \frac{2a^2}{a^2+b^2} = \frac{3}{2}, \\ \frac{a^2(1-b^2)}{a^2+b^2} = \frac{1}{4}; \end{cases} \quad \text{或} \quad (II) \begin{cases} \frac{2a^2}{a^2+b^2} = \frac{1}{2}, \\ \frac{a^2(1-b^2)}{a^2+b^2} = -\frac{1}{4}. \end{cases} \quad \text{---10分}$$

解方程组(I), (II), 得

$$\begin{cases} a^2 = 2, \\ b^2 = \frac{2}{3}; \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a^2 = \frac{2}{3}, \\ b^2 = 2. \end{cases}$$

故所求椭圆的方程为

$$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{\frac{2}{3}} = 1, \quad \text{或} \quad \frac{x^2}{\frac{2}{3}} + \frac{y^2}{2} = 1. \quad \text{---12分}$$

解法二 同解法一得

$$(a^2+b^2)x^2 + 2a^2x + a^2(1-b^2) = 0, \quad \text{③} \quad \text{---2分}$$

解方程③得

$$x_1 = \frac{-a^2 + ab\sqrt{a^2+b^2-1}}{a^2+b^2}, \quad x_2 = \frac{-a^2 - ab\sqrt{a^2+b^2-1}}{a^2+b^2}. \quad \text{④} \quad \text{---4}$$

分

则直线  $y=x+1$  与椭圆的交点为

$P(x_1, x_1+1), Q(x_2, x_2+1).$

由题设  $OP \perp OQ$ , 得